

**ZUR PATHOGENESE
AKUTER MAGEN-DUODENAL-
SCHLEIMHAUTLÄSIONEN**

Inaugural-Dissertation

von

Doris Heimann

Mainz 1966

Aus dem Pathologischen Institut der Universität Mainz

Direktor: Professor Dr. H. Bredt

**ZUR PATHOGENESE
AKUTER MAGEN-DUODENAL-
SCHLEIMHAUTLÄSIONEN**

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz

vorgelegt von
Doris Heimann
aus Berlin

Mainz 1966



Dekan: Professor Dr. Borneff
Referent: Professor Dr. H.G. Fassbender
Korreferent: Professor Dr. H. Bredt
Tag der münd-
lichen Prüfung: 16.2.1967



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554814_0043

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

A. Einleitung

B. Fragestellung

C. Material

D. Mathematisch-statistische Methodik

E. Ergebnisse

F. Besprechung der Ergebnisse

G. Zusammenfassung

H. Anhang

I. Literatur

J. Lebenslauf

A. Einleitung.

== =====

Bei Obduktionen fallen immer wieder Magenschleimhautdefekte, gelegentlich auch Duodenalschleimhautdefekte, auf, nachdem verschiedenartige Prozesse in Kopf-, Brust- und Bauchbereich vorausgegangen sind. Im Vordergrund stehen Traumen im weitesten Sinne, die eine der drei Körperregionen betreffen. Diese Magenschleimhautläsionen können innerhalb kurzer Zeit zu massiven tödlichen Blutungen führen.

Bei unserer Betrachtung muß scharf zwischen dem klassischen Ulcus callosum chronicum und diesen akut entstandenen Schleimhautdefekten, bei denen es sich um petechiale Blutungen und Erosionen, aber auch um akute Ulcera handeln kann, unterschieden werden.

Um den Mechanismus eines solchen Vorganges zu illustrieren, möchten wir im folgenden einige typische Beispiele anführen:

Fall 1:

Ein 58jähriger Fußgänger wird von einem Auto angefahren. Mit Schädelfraktur und mehreren Extremitätenfrakturen wird er in die Klinik eingeliefert. Kurz danach erbricht er mehrmals. In der Nacht wird der Patient somnolent, beide Pupillen sind verengt und lichtstarr. Nach zwei Tagen treten epileptiforme Krämpfe auf. Am dritten Tag werden Atmung und Puls immer unregelmäßiger, und in der Nacht verstirbt der Patient.

Die Obduktion ergibt eine schwere Contusio cerebri und ein Hirnödem. Das Duodenum zeigt zahlreiche landkarten-





Abb. 1 Akute Erosion in der Duodenalschleimhaut.

(58jähriger Mann - Schädelbasisfraktur nach Verkehrsunfall



bb. 2 Akute Erosion , voll ausgebildet. Muscularis mucosa alten.
(58jähriger Mann - Schädelbasisfraktur nach Verkehrsunfall)




Abb. 3 Akute Magenschleimhaut-Erosionen im Pylorusbereich.
(20jähriger Soldat - Kollaps bei Hitzemarsch)




Abb. 4 Akute Erosion - noch nicht voll ausgebildet
(20 jähriger Soldat - Kollaps bei Hitzemarsch)

artig begrenzte Erosionen, die mit schwarzem Blut bedeckt sind. Der gesamte Dünndarm ist mit etwa 2 l blutigem Inhalt gefüllt.

Fall 2:

Ein 20jähriger Soldat erleidet bei einem Leistungsmarsch unter einer Gasmaske einen Hitzschlag. Er kommt in einen Kreislaufkollaps, und kurz darauf verstirbt er in einem Krankenhaus.

Bei der Obduktion findet sich ein Hirnödem. Der gesamte Magen-Darmtrakt ist von blutigen Massen angefüllt. Die Schleimhaut von Magen und Duodenum zeigt zahlreiche petechiale Blutungen und im Pylorusbereich finden sich außerdem mehrere Erosionen mit blutig belegten Rändern. Weiterhin finden sich Lungenödem und subendokardiale Blutungen.

Fall 3:

Bei einem 60jährigen Patienten wird eine Thoracotomie mit Decortikation der Lunge vorgenommen. Aus einem infizierten Hämatothorax wird 1 l Eiter entleert.

Zunächst ist der postoperative Verlauf komplikationslos. Am fünften Tag kollabiert der Patient plötzlich und zeigt massiv Teerstühle. Er erhält Bluttransfusionen. Einen Tag später kommt es zu erneutem Kollaps, um Mitternacht verstirbt der Patient.

Die Autopsie ergibt ein frisches markstückgroßes Ulcus




Abb.5 Akutes Ulcus duodeni mit Arrosion der A. gastroduodenalis nach Pleuradecortikation links
(60 jähriger Mann - Thoracotomie)




Abb. 6 Arrodierter A. gastro-duodenalis nach Pleura-
decortikation links
(60 jähriger Mann - Thoracotomie)




Abb. 7 Multiple petechiale Blutungen in der Schleimhaut des Magenfundus.
(52jähriger Mann - Sprung vom Faß)

1 cm distal vom Pylorus. Der Boden wird vom Pankreasgewebe gebildet, in den Ulcuskrater ragt die arrodierte A. gastroduodenalis. Magen, Dünndarm und ein Teil des Dickdarms sind mit Blut gefüllt.

Fall 4:

Ein Weinkaufmann springt gegen 16 Uhr von einem Fass, dabei verspürt er einen plötzlichen Schmerz im Oberbauch. Der hinzugezogene Arzt gibt Pantopon und Kampfer. Gegen Abend kommt es zu erneuten Schmerzen und Erbrechen, die anhalten. Um 5 Uhr am nächsten Morgen wird der Mann in einem Kreislaufkollaps in ein Krankenhaus eingewiesen. Die Bauchdecken sind gespannt, es besteht der Verdacht auf eine Zwerchfellruptur oder ein Aortenaneurysma. Die Therapie besteht in Makrodex und Bluttransfusionen. Gegen 12 Uhr verstirbt der Patient.

Die Obduktion ergibt einen 1 cm großen Milzkapselriß, aus dem etwa 50 ccm Blut in die Bauchhöhle gesickert sind. Der Magen ist mit ca. 1 l flüssigem Blut gefüllt, und die Schleimhaut zeigt diffuse Blutungen. Subendokardiale Blutungen und Lungenödem sind ebenfalls zu finden.

Die vorliegende Arbeit soll sich ausschließlich mit diesen akut entstandenen Magen-Duodenal-Schleimhautdefekten befassen. Unter diese Prozesse in Kopf-, Brust- und Bauchbereich reihen wir ein: stumpfe Gewalteinwirkungen, Operationen oder akut reizende Vorgänge in den drei Körperhöhlen, ferner Verbrennungen.

Auf den ersten Blick scheint ein Zusammenhang zwischen diesen Prozessen und einer Magen-Duodenal-Schleimhautläsion (MDL) schwer denkbar. Unsere Vorstellungen sind im allgemeinen geprägt von den klassischen Theorien über die Entstehung des Magenulcus. Es sind dies:

1) Gefäßtheorie von Virchow (1853).

Grobmechanische Gefäßverlegungen durch Embolien, Thrombosen oder Gefäßerkrankungen verursachen Zirkulationsstörungen, die zum hämorrhagischen Schleimhautinfarkt führen. Anschließend kommt es zur Andauung durch den Magensaft.

2) Theorie der neurogenen Ulcusentstehung nach von Bergmann (1913).

Nach seiner Theorie vom spasmogenen Ulcus kommt es durch Spasmen der muscularis mucosae oder muscularis propria oder durch Kontraktion der Gefäßmuskulatur zu anämischen Schleimhautnekrosen. Sie können nun vom Magensaft ange-daut werden.

Funktionelle Zirkulationsstörungen werden auch von Klebs (1868) beobachtet, er beschreibt einen Spasmus der Arteriolen.

Lichtenbelt (1912) vermutet "Vagusstörungen", die durch Kontraktion der musc. mucosae eine Ischämie verursachen. Rössle (1913) bezeichnet das Ulcus als "zweite Krankheit". Er glaubt, dass es sekundär durch reflektorische Vagusreizung bei primärer Erkrankung anderer Organe zur Ulcusentstehung kommt.

3) Peptische Theorie.

Diese Theorie wurde von Günzburg (1852) begründet, später wurde sie von Büchner und seiner Schule ausgebaut. Nach deren Auffassung sind Ulcera peptische Veränderungen, die auf einer Korrelationsstörung zwischen der verdauenden Kraft des Magensaftes und dem Schleimschutz der Magen-Duodenal-Schleimhaut beruhen.

4) Entzündungstheorie von Konjetzny (1947).

Er sieht im Ulcus den Folgesustand einer Gastritis. Eine gewisse Wirkung wird dabei auch dem Magensaft zugeschrieben.

Diese Theorien betreffen jedoch die Genese des Ulcus chron. call. Uns interessieren dagegen die von uns beobachteten und auch in der Literatur zitierten akuten Magen-Duodenal-Läsionen (MDL), die in engem Zusammenhang mit anderen pathologischen Vorgängen auftreten. Es werden Hämorrhagien, Erosionen und akute Ulcera beschrieben. Die Erosion reicht nur bis zur musc. mucosae, während sich das Ulcus bis in die musc. propria ausdehnt.

Der Begriff der hämorrhagischen Magenschleimhauterosion wurde erstmals von Cruveilhier (1829) geprägt. Er gibt in seinem Atlas eine Abbildung von Form und Sitz der Erosion.




Abb. 8 Unregelmäßig gestaltete, landkartenförmig ausgebreitete
hämorrhagische Erosionen der Magenschleimhaut.

(Nach Cruveilheir, 1. c. pl. 1, fig. 2)




Abb. 9 Hämorrhagische Erosionen des Magens und Duodenums.

(Nach Cruveilheir, Anat. Patholog. du Corps Humain,
Tome 2, livr. 31, pl. 1, fig. 1)

Nach der allgemeinen Anschauung geht der Erosion eine umschriebene Hämorrhagie voraus. Es folgt die Schleimhautnekrose mit Verschorfung und schließlich die eigentliche, bis zur musc. mucosae reichende Erosion.

Büchner, Konjetzny und Merkel (1941) sehen in der Erosion das Anfangsstadium des Ulcus chron. callosum. Zeitlich ist der Übergang von der Erosion zum Ulcus nicht genau festzulegen, aber man kann wohl sagen, daß nach etwa acht Tagen die Erosion entweder abheilt oder sich zum Ulcus entwickelt. Bevor wir unsere eigene Fragestellung formulieren, möchten wir eine Reihe von Begriffen, die in die Literatur Eingang gefunden haben und sich bereits zum Teil im gängigen Gebrauch befinden, kurz definieren.

Exulceratio simplex Dieulafoy.

Dieulafoy beschreibt 1899 eine akute, tödliche Magenblutung. Die "Exulceratio" ist aber identisch mit der akuten Magenschleimhauterosion, und der Autor will sie scharf vom chronisch callösen Ulcus getrennt wissen. Durch das unglückliche Auftreffen der Erosion auf eine submuköse Arterie kommt es bei den von Dieulafoy beobachteten Patienten innerhalb kurzer Zeit zu massiver tödlicher Blutung.

Curling Ulcer.

1892 wurde erstmals von Curling der pathogenetische Zusammenhang zwischen einer Verbrennung und einem Duodenalulcus vermutet. Aus der Beschreibung ist nicht zu ersehen, ob es sich dabei um ein echtes Ulcus oder nur um eine Erosion handelt.



Abb. 10 Hämorrhagien im Rahmen des Mallory-Weiss-Syndroms.
(68jährige Frau - Pleuracarcinomatose)

Mallory-Weiss-Syndrom.

Unter dem Mallory-Weiss-Syndrom versteht man eine akute Hämatemesis nach Erbrechen verschiedenster Genese. Es wurde 1929 zuerst von Mallory und Weiss beschrieben. Am häufigsten wird es bei Alkoholikern beobachtet. Pathologisch-anatomisch finden sich im Magen am Übergang vom Ösophagus zur Kardia parallel zur Längsachse des Magens verlaufend 3 - 4 cm messende Schleimhauteinrisse. Diese werden durch Einreißen der Mucosa beim Brechakt erklärt.

Stress-Ulcus.

Dieser Begriff wurde erstmals von Selye gebraucht. Selye hat "Stress" ganz allgemein als eine ungewöhnliche psychische und somatische Belastung definiert. Auch er unterscheidet scharf zwischen akuten Magenerosionen und dem chronisch callösen Ulcus. Selye glaubt heute -- entgegen seiner früheren Auffassung --, daß eine gesteigerte Glucocorticoidausscheidung zur Entstehung eines akuten Magenulcus nicht erforderlich ist, vielmehr macht er neuerdings nervöse Faktoren für die Pathogenese des akuten Ulcus verantwortlich.

Cortison-Ulcus.

Bei Patienten, die eine zeitlang mit Cortisonpräparaten behandelt werden, kann ein akutes Ulcus mit Blutung und Perforation entstehen. Möglicherweise ist dafür eine erhöhte Pepsinogensekretion der Magenmucosa mit verantwortlich zu machen. Westphal (1951) konnte bei Versuchspersonen nach verschiedenen Stress-Einwirkungen eine erhöhte

Pepsinogensekretion, die indirekt durch die Uropepsin-ausscheidung bestimmt wurde, feststellen. Auch Selye betonte früher, daß starke Glucocorticoidüberdosierungen zu einem akuten Magenulcus führen können. Er sieht einen Synergismus zwischen den Glucocorticoiden und nicht hormonell vermittelten Aktionen eines allgemeinen Stress.

Beim Studium der Literatur fällt auf, daß jedoch zwischen Ulcus und Erosion selten mit genügender Schärfe unterschieden wird. Während manche Autoren ausschließlich von Ulcera sprechen, differenzieren andere zwischen akuter Erosion und chronischem Ulcus. Im allgemeinen wird man sagen können, daß es sich bei den akuten Veränderungen um Erosionen handelt, bei denen aber dennoch die Möglichkeit eines rapiden Fortschreitens besteht. Wenn die Erosionen nicht abheilen, führen sie entweder zu Frühperforationen oder entwickeln sich langsam zum Ulcus.

In der Literatur werden Ulcera und Erosionen erwähnt nach:

1) Verbrennungen

2) Hirnläsionen

3) Operationen in Kopf-, Brust- und Bauchbereich

4) Stumpfen Brust- und Bauchtraumen.

1) Verbrennungen.

1833 beschreibt Macfarlane als erster zwei "Duodenalulcera", die bei einem 8jährigen Knaben nach einer ausgedehnten Verbrennung entstanden sind. Den pathogenetischen Zusammenhang

vermutet erstmals Curling 1842. Er weist auf die Bedeutung der Verbrennung für das Entstehen von "Duodenalulcera" hin. Curling beschreibt 13 Patienten im Alter von 3 - 28 Jahren mit starken Verbrennungen 2. und 3. Grades. 6 Patienten beobachtete er selbst, von den anderen wird ihm berichtet. 3 Patienten sterben jeweils am 6., 8. und 10. Tag an der Frühperforation eines "Duodenalulcus" mit nachfolgender Peritonitis. 6 Patienten kommen zwischen dem 8. und 18. Tag durch massive Hämorrhagie ad exitum. Autopsisch ergibt sich ein penetrierendes "Duodenalulcus" ins Pankreas. 1 Patient stirbt nach der 5. Woche, er zeigt ebenfalls eine Ulcuspenetration ins Pankreas. Bei 2 Patienten, die am 3. Tag verstarben, fand sich nur eine starke Rötung des Duodenums. Bei einer jungen Frau wurde nach dem Tod in der 8. Woche nur eine Ulcusnarbe im Duodenum festgestellt.

Weitere Beobachtungen über akute Ulcera nach Verbrennungen stammen von Demme (1884), Kirchmayr (1922), Deters (1950), Woldman (1952). 1957 berichten Hummel, Lanchantin und Artz von 1000 Patienten, die in 6 1/2 Jahren von Dezember 1949 bis Mai 1956 wegen Verbrennungen behandelt werden. Von den 1000 Patienten sterben 80, gastrointestinale Läsionen werden 16mal gefunden. Das Ausmaß der durchschnittlichen Verbrennung beträgt bei den 16 Patienten 60 % der Körperoberfläche. Bei 10 Patienten kommt es zwischen dem 2. und 48. Tag zu akuter Hämatemesis. 2 Patienten sterben an Ulcusperforation im 2. Monat. 2 weitere Kranke bekommen massives Bluterbrechen, das zum Tode führt. Die übrigen Patienten sterben aus anderen Ursachen. Am häufigsten ist das "Ulcus" im Duodenum zu finden, es wird 9mal getroffen. Bei 3 weiteren Autopsien ist ein "Ulcus" im Magen und Duodenum gleichzeitig lokalisiert,

3mal nur im Magen und in einem Fall in Duodenum und Jejunum. Bei 26 Patienten mit starken und schwächeren Verbrennungen wird die Uropepsinausscheidung gemessen. Der Wert läßt nach Meinung der Autoren keine sichere Ulcusdiagnose zu, da auch Patienten mit sehr schwachen Verbrennungen und keinem Ulcus eine erhöhte Uropepsinausscheidung haben.

Experimentell werden von Busse (1914) bei Kaninchen Verbrennungsulcera erzeugt. 4 Kaninchen wird der Rücken mit kochendem Wasser verbrüht. Ein Tier stirbt sofort, die 3 übrigen werden nach 4 Tagen getötet. Ein Tier hat Blutungen und Schorfbildungen im Magen, Duodenum und Jejunum. Die beiden anderen Tiere zeigen schwerste ausgedehnte Verschorfungen des Duodenums. Curling und Hunter (1893), Busse (1914) und Vassale und Sacchi (1893) betrachten die bei der Verbrennung auftretende Intoxikation als Ursache für die "Ulcusentstehung".

2) Hirnläsionen.

1849 beschreibt Rokitansky als erster das Zusammentreffen von "Ulcus" und Hirnerkrankungen. 1932 veröffentlicht Cushing einen Bericht von 7 Patienten, die nach einem intracranialen Prozess autoptisch gastrointestinale Läsionen zeigen. 4 Patienten werden an einem Hirntumor operiert. 2 der Operierten sterben am 1. und 4. Tag. Autoptisch ergeben sich Frühperforationen, einmal an der kleinen Kurvatur des Magens, der zweite Patient hat multiple Duodenalperforationen. Die beiden übrigen Patienten sterben am 2. und 6. Tag postoperativ. Autoptisch ergeben sich bei beiden Patienten Magenerosionen. Bei einem Patienten wird eine Operation wegen vermutetem Hirn-

tumor vorgenommen. Der Patient verstirbt am 3. Tag nach der Operation. Autoptisch wird eine Malazie des Magens und eine Perforation des Fundus festgestellt. Ein weiterer Patient mit einem Medulloblastom des Kleinhirns, der nach 2 Jahren stirbt, zeigt autoptisch die Spuren eines vernarbten Duodenalulcus. Ein letzter Patient, der wegen eines Hirntumors Röntgenstrahlen erhält, bekommt nach einem Jahr Magenbeschwerden. Nach wiederholten Bestrahlungen stellen sich erneut Magenbeschwerden ein. Eine Röntgenaufnahme des Magens und Duodenums zeigt die Spuren einer Ulcusnarbe im Duodenum. Bei den beiden letzten Patienten läßt sich ein chronisches Ulcus annehmen. Cushing vermutet, dass es durch Vaguserregung zu Hypersekretion, Hypermotilität, Hypertonus und Übersäuerung, besonders im Pylorusbereich, kommt. Spasmen der Muskulatur, begleitet von Spasmen der Gefäße, führen zur Ischämie und hämorrhagischen Infarzierung der Schleimhaut. Diese Stellen werden nun vom Magensaft angegriffen und abgedaut.

1934 beschreiben Masten und Bunts das Zusammentreffen von intracranialen Prozessen und Magen-Darm-Läsionen. 1935 berichtet Grant von 2 Patienten, die nach Operationen eines Hirntumors autoptisch "Duodenalulcera" aufweisen. Boles und Riggs (1940) glauben, daß der erhöhte Hirndruck für Magenerosionen und Ulcera verantwortlich ist. Veil und Sturm (1942) berichten von Schädelhirntraumen im Krieg. Nach diesen Traumen sehen sie innerhalb kurzer Zeit "Ulcera" entstehen. Dagegen dauert in einem Fall nach einer Fremdkörperverletzung des Gehirnes die Manifestation des Ulcus 22 Jahre. Dieser Zusammenhang dürfte wohl etwas fraglich sein. Die Autoren

machen Zwischenhirnstörungen für die Ulcusgenese verantwortlich. Sympathisch vermittelte, von der Magenmotorik unabhängige Vaskonstriktionen sollen zum Ulcus führen.

1944 werden von Kalk und Brühl 142 Hirnverletzte des Krieges untersucht. Bei 5 Patienten wird ein Ulcus duodeni festgestellt, der Zusammenhang mit der Hirnverletzung scheint hier unwahrscheinlich. Ein Patient bekommt 19 Monate nach seiner Hirnverletzung ein Doppelulcus im Antrum pylori, das nach 3 Wochen abheilt. Dieser Patient hat eine Epilepsie nach seiner Hirnverletzung zurückbehalten. 1947 stellt Strassmann ein Sektionsmaterial von 196 Patienten mit Hirnläsionen zusammen. Die Schädigungen sind: Hirnblutungen, Traumen, Hirnthrombosen und Hirnembolien, Tumoren, Meningitis, Abszesse, Encephalitis, Barbituratvergiftung und Zerebralsklerose. Er teilt in 5 Gruppen auf:

Gruppe 1	mit 59 Patienten	hat keine Magen-Darmveränderung.
Gruppe 2	mit 89 Patienten	zeigt eine geringe Blutung in Magen und Duodenum.
Gruppe 3	mit 24 Patienten	weist eine stärkere Hämorrhagie mit blutigem Mageninhalt und Pechstühlen auf.
Gruppe 4	mit 14 Patienten	läßt blutende "Ulcera" erkennen.
Gruppe 5	mit 10 Patienten	ist wegen Magenfäulnis nicht zu verwerten.

Zwischen Erosionen und Ulcera wurde nicht genau unterschieden.

Weitere Berichte von Hirnläsionen und Ulcus geben: Staemmler (1949), Wyatt und Khoo (1949), Schlumberger (1951). 1961 finden Tönnis und Bischof bei einer Anzahl von 3622 klinischen Patienten mit cerebralen Erkrankungen in 3,2 % der Fälle Magen-Darm-Symptome. Ein ursächlicher Zusammenhang wird von den Autoren bezweifelt. 1964 weisen Vogel, Hempel und Lange bei einem Material von 810 Sektionen Magenblutungen nach Hirnprozessen in folgender Häufigkeit nach: nach Hirntumoren in 42 %, nach Kopftraumen in 32 % der Fälle. Fassbender beschreibt in einer unveröffentlichten Arbeit akute Todesfälle nach intracranialen Prozessen wie Hirntumoren, Apoplexien und Hirntraumen, die sich innerhalb von 20 Stunden ereignen. Die Patienten sterben unter dem klinischen Bild des Kollapses. Autopsisch ergibt sich fast in jedem Fall eine Trias von Magenschleimhautblutungen, Lungenödem und subendokardialen Blutungen. Ein tödlicher Vagusreflex wird für den akuten Tod verantwortlich gemacht.

Experimentell hat Schiff bereits 1845 am Kaninchen nach Durchschneidung des Thalamus opticus und der Pedunculi cerebri am 4. Tag hämorrhagische Infiltrationen und Erweichung der Magenschleimhaut gesehen. Bei Hunden erzeugt er nach Verletzung der Pons und des verlängerten Marks Ulcera. Ein Tier stirbt am 15. Tag an Ulcusperforation in der Pars pylorica. Weiterhin werden Magen-Darmschleimhautläsionen nach experimenteller Schädigung des Gehirns beobachtet von : Ebstein (1874), Burdenko und Mogilnitzky (1926), Hoff und Sheehan (1935) und Keller (1936).

Die Magen-Duodenal-Darmschleimhautblutungen, die im Anschluß an eine Operation im Brust- und Bauchraum entstehen, erregen ebenfalls schon früh Interesse.

3 a) Operationen im Brustbereich.

1867 beschreibt Billroth eine Strumektomie bei einem 47jährigen Mann. Am 4. postoperativen Tag kommt es zu Melaena, am 5. Tag stirbt der Mann im Kollaps. Autopsisch werden ein Duodenalulcus und drei weitere Schleimhautdefekte im Duodenum festgestellt. Billroth vermutet eine allgemeine Sepsis. Von Fassbender werden Magenschleimhautblutungen nach Strumektomien, Dekortikationen der Lunge und Lungenembolien beschrieben. Der jeweils sehr akute Tod wird nach seiner Meinung durch einen Vagusreflex verursacht.

1964 berichten Konrad und Wedell von akuten Magenblutungen nach großen thorakalen Eingriffen, besonders an Herz und Gefäßen. Von 5479 Operierten werden bei 154 Patienten Magenblutungen beobachtet, das sind 3 %. Oberbauchsymptome oder ein plötzlicher Kreislaufkollaps mit Tachykardie, Blässe und Übelkeit kündigen die akute Blutung an. Meist wird nach 2 Tagen Teerstuhl entleert. Bei Kindern wird die Hämatemesis doppelt so häufig gesehen. P_H -Wert, Pepsin und peptische Aktivität des Magensaftes werden während der Operation erhöht gefunden. Uropepsin zeigt besonders nach der Operation erhöhte Werte. Pathologisch-anatomisch zeigen die Verstorbenen bis durchschnittlich zum 5. Tag Erosionen, später Ulcera. Als Genese wird von den Autoren eine vagale Reizung, Veränderung der Hämodynamik bei Herzoperierten, eine Erythrozytenaggregation in Hypothermie, eine hypoxämische Schädigung infolge chronischer Blutstauung und Embolie diskutiert.

3 b) Operationen im Bauchbereich.

1867 veröffentlicht Rindfleisch einen Bericht von einer postoperativen Magenblutung im Anschluß an eine Herniotomie.

Am 2. Tag postoperativ beginnen bereits Pechstühle, die bis zum Exitus am 5. Tag anhalten. Die Autopsie ergibt ein frisches Magenulcus und mehrere hämorrhagische Erosionen. 1899

berichtet von Eiselsberg über Magen-Darmblutungen nach Operationen im Bauchraum. Er hat 8 derartige Fälle beobachtet.

6 Patienten haben zwischen dem 1. und 8. Tag postoperativ eine Hämatemesis; die beiden übrigen, die nach dem 3. und

5. Tag sterben, zeigen autoptisch frische Hämorrhagien und hämorrhagische Erosionen im Magen. 3 Patienten werden ge-

heilt entlassen. 3 weitere Patienten, die am 2., 8. und 9. Tag ad exitum kommen, lassen autoptisch Erosionen und

Ulcera, einmal sogar eine Frühperforation im Duodenum, erkennen. 1905 beschreibt Busse 96 Fälle, wo es nach Operationen im Bauchraum zur Hämatemesis kommt. Meistens tritt

das Bluterbrechen in den ersten drei Tagen auf. 1911 erscheint ein Bericht von Winniwarter über Hämatemesis nach

Eingriffen im Bauchraum. Er beobachtet Bluterbrechen bei 30 Patienten, am häufigsten in den ersten 3 Tagen postoperativ.

17 Patienten sterben an Peritonitis und anderen Komplikationen.

Autoptisch werden bei 5 Patienten Erosionen im Magen festgestellt, bei den übrigen läßt der Magen keine Zeichen einer

Blutung erkennen. Winniwarter betont, daß diese Magen-Darmblutungen nichts mit einem echten Ulcus ventriculi gemeinsam haben. Sie heilen ebenso schnell, wie sie entstanden sind.

1933 berichtet Fenker von tödlichen Operationen im Bauchraum. Nach der Autopsie zeigen die Patienten diffuse Magenschleimhautblutungen. Der Autor glaubt, daß diese Blutungen

durch Schädigungen des vegetativen Nervensystems zustande kommen und nichts mit dem üblichen Ulcus ventriculi zu tun haben. Weitere Veröffentlichungen von Magen-Darmblutungen im Anschluß an Bauchoperationen stammen von Wachsmuth (1942 und 1953). Fassbender beschreibt akute Todesfälle nach Eingriffen im Bauchraum. Die Sektion der Verstorbenen ergibt Magenschleimhautblutungen. Der akute Tod soll durch einen Vagusreflex zustande kommen.

Zahlreiche experimentelle Ergebnisse über Eingriffe in Brust- und Bauchraum bei Versuchstieren liegen vor.

Eingriffe im Brustraum.

a) Vagusdurchschneidung.

1890 sieht Talma nach einseitiger Vagusdurchtrennung am Hals des Kaninchens mit nachfolgender faradischer Reizung des peripherischen Endes im Magen bis in die Muscularis reichende Ulcera entstehen. Zu gleichen Ergebnissen kommen Saitta (1900) und Marchetti (1906).

b) Reizung der Pleura.

Fassbender beobachtet nach Formalininjektionen in die Pleurahöhle von 15 Kaninchen nach 2 1/2 Minuten bei allen Tieren einen Schock, der im tödlichen Kollaps endet. Unmittelbar nach der Injektion treten folgende parasymphatische Reizsymptome auf:

- 1) bei allen Tieren eine Miosis
- 2) bei einigen Tieren eine starke Tränensekretion
- 3) bei einigen Tieren starker Speichelfluß
- 4) bei 14 Tieren stärkere Dyspnoe.

Magenschleimhautblutungen finden sich bei den 2 am längsten überlebenden Tieren, das ist nach 4 und 11 1/2 Minuten. Die Auswertung des Ekg zeigt bei allen Tieren eine erhebliche Bradykardie mit Absinken der Pulsfrequenz auf 1/3 der Norm. Es ergeben sich starke Überleitungsstörungen bis zum AV-Block. Lungenödem und subendokardiale Blutungen sind weiterhin zu finden.

Eingriffe im Bauchraum.

a) Vagusdurchschneidung.

1906 beobachten Marchetti und Ophüls bei Kaninchen nach Durchtrennung des Vagus unterhalb des Diaphragma Ulcera und hämorrhagische Erosionen im Magen. Das gleiche finden Zironi (1910), Kawamura (1911) und Lichtenbelt (1912). Keppich (1912) erzeugt neben Vagusdurchtrennung noch nach peritonealer Faradisierung eines oder beider Vagi bei Kaninchen Schleimhautblutungen im Fundus des Magens.

b) Extirpation des Plexus coeliacus.

Pincus sieht bereits 1856 nach Entfernung des Plexus coeliacus beim Kaninchen Magen- und Darmblutungen entstehen. Gleiche Ergebnisse haben: Dalla Vedova (1902), Kobayashi (1909), Kawamura (1911). 1918 nimmt Gundelfinger ausgedehnte Experimente an Hunden vor. Neben der Extirpation des Plexus coeliacus werden bei einigen Tieren noch die Vagi durchtrennt. Bei allen Tieren, die zwischen 1. und 57. Tag getötet werden, sind Ulcera und Erosionen des Magens und Duodenums zu finden.

c) Adrenalineinspritzung in die Magenwand.

Kobayashi (1909) erzeugt bei Hunden nach Einspritzen von Adrenalin in die Magenwand nach 2 - 4 Tagen hämorrhagische und ischämische Erosionen. Rosenbach und Eschker (1911) haben die gleichen Ergebnisse.

d) Injektion von Formalin.

Fassbender injiziert 6 Kaninchen 36 % Formalin in die Peritonealhöhle. Alle 6 Tiere sterben 10 - 15 Minuten nach der Injektion. Nach 3 Minuten tritt ein schwerer Schock auf, der im Kollaps endet. Nach 5 Minuten treten parasymphatische Reizsymptome auf: Miosis, Tränen- und Speichelfluß, zuletzt noch Urin- und Faecesabgang. Die Tiere zeigen autoptisch Magenschleimhautblutungen in Fundus und Kardia, außerdem finden sich subendokardiale Blutungen und Lungenödeme. Weiteren 7 Kaninchen wird nach Basisnarkose mit Urethan und Megaphen Formalin injiziert. 3 Tiere überleben den Schock völlig. Die Autopsie nach 3 Wochen zeigt keine pathologischen Besonderheiten. Die übrigen 4 Tiere sterben zwischen 5 und 22 Stunden.

e) Pharmakologische Reizung des Vagus.

1914 erzeugt Westphal durch subkutane hochdosierte Pilocarpineinspritzungen bei Kaninchen, Hunden und Meerschweinchen Erosionen und Ulcera in Magen und Duodenum. Zuerst beobachtet er am laparotomierten Kaninchen stärkste Krämpfe sämtlicher Eingeweide, schließlich ein Nachlassen der Peristaltik. Der Tonus im Magen bleibt hoch. Als erstes werden durch Kontraktion

der Muscularis die Venen, dann die Arterien der Musc. propria abgeklemmt. Es kommt zu Zyanose und Blässe der Magenwand. Plötzlich entstehen in der Submukosa kleine kreisrunde anämische Bezirke, die an Zahl ständig zunehmen. Der eindringende Magensaft färbt diese Bezirke durch Bildung von salzsaurem Hämatin braun. Einmal wird sogar der Durchbruch eines Ulcus beobachtet. Haeller (1920) sieht durch Physostigmin, Atropin, Morphin und CO_2 Erosionen und Geschwüre im Magen entstehen. Er macht die schwere Kreislauf- und Stoffwechselstörung zusammen mit einem wirksamen Magensaft für die Ulcusebene verantwortlich. Merkel veröffentlicht 1942 Versuche mit Histamin an Meerschweinchen. Der Magen wird in Äthernarkose vorgelagert, sodaß die Veränderungen augenblicklich zu erkennen sind. Relativ hohe Histamindosen in kurzer Zeit führen zur venösen und kapillären Hyperämie der Magenwand, besonders der Schleimhaut. Es kommt zur Stase des Blutes in den Leistenspitzenkapillaren. Ein Ödem der Magenwand ist gleichzeitig zu beobachten. Durch Auflockerung des Gewebes und Durchlässigkeit der Kapillaren dringt der Magensaft ein. Es bilden sich Thrombosen und salzsaures Hämatin. Darauf folgt eine Epithelabstoßung und Ausfransung sämtlicher Magenwandschichten. In 4 Fällen kommt es nach 45 Minuten bis 3 1/2 Stunden zur Perforation. Andere Tiere, die bis zu 80 Tagen am Leben bleiben, zeigen alle Übergänge von einer ersten Zirkulationsstörung über Erosion, Ulcus bis zum callosen Ulcus. Nach Merckels Auffassung ist der Magensaft für die peptischen Veränderungen unentbehrlich. 1949 werden diese Versuche Merckels von Roulet experimentell bestätigt.

Overzier (1955) erzeugte durch intraperitoneale Histamineinspritzungen bei Ratten multiple Magenulcera. Er sah zwei Arten von Geschwüren entstehen: ein trichterförmiges, das durch eine Durchblutungsstörung größerer Gefäße zustande kommt und ein kraterförmiges, das durch eine kapilläre Durchblutungsstörung zu erklären ist.

4 a) Stumpfes Brusttrauma.

1913 berichtet Gruber von einem 39jährigen Patienten, der durch einen fallenden Gegenstand heftig im Brustbereich getroffen wird. 60 Stunden später stirbt er an den Verletzungen im Thoraxbereich. Die Autopsie ergibt ein frisches blutendes Duodenalulcus. Fassbender beschreibt Magenschleimhautblutungen im Anschluß an stumpfe Brusttraumen. Es wird ein Vagusreflex angenommen.

4 b) Stumpfes Bauchtrauma.

1876 beschreibt Lebert bei 2 Patienten nach einem stumpfen Bauchtrauma eine Hämatemesis. Einmal wird das Bluterbrechen durch Sturz von einer Treppe auf den Bauch, das andere Mal durch Quetschung der Bauchregion ausgelöst. Weitere Berichte von stumpfen Bauchtraumen und nachfolgender Magen-Darmblutung geben: Leube (1886), Ritter (1887), Kroenlein (1899), Thiem (1899), Fertig (1905), Lieblein (1907), Edelmann (1918). 1953 beschreiben Crohn und Gerendasy eine traumatisch bedingte Magenblutung. Eine Frau schlägt im Autobus mit dem Bauch auf einen Sitz auf. Am nächsten Tag treten Pechstühle auf, 2 Tage später akute Hämatemesis. Bluterbrechen und Pechstühle halten einige Tage an, nach

einem Monat ist die Frau beschwerdefrei. Fassbender sieht Magenschleimhautblutungen nach stumpfen Bauchtraumen und Peritonitiden entstehen.

Experimentell erzeugt 1887 Ritter bei Hunden traumatische Magenläsionen. Durch mässige Hammerschläge auf die Magengegend des Hundes wird eine umschriebene Blutung und Abhebung der Mucosa des Magens festgestellt. Vanni (1889) erhält bei Kaninchen nach Schlag auf den Magen nach 4 - 5 Tagen Ulcera und Erosionen, nach 9 Tagen eine Perforation.

Akut einsetzende Magen-Darmblutungen.

Akute Magen-Darmblutungen, deren auslösende Ursachen sich nicht feststellen lassen, beschreibt Dieulafoy 1899. Er trennt klar die akute Erosion vom bekannten *Ulcus simplex*. Er spricht in seinem Bericht von der "*Exulceratio simplex*", die mit der Erosion identisch ist. Diese Erosion zeigt sich ganz plötzlich mit massivem Bluterbrechen. Schwindel und Magendruck können die Hämatemesis begleiten. "On dirait vraiment que son histoire clinique ne commence qu'à l'hémorrhagie, et quelle hémorrhagie!". Die Blutungen wiederholen sich und führen innerhalb weniger Tage zum Tode. Meistens sind junge Leute betroffen.

Pathologisch-anatomisch beschreibt Dieulafoy eine runde, manchmal elliptische oder sternförmige Läsion von 50 Centimes- bis 2 Francs-Stück-Größe. Die Erosion kann an jeder Stelle des Magens sitzen. Sie unterscheidet sich vom *Ulcus simplex*,

sie hat keine verhärteten und vorspringenden Ränder, und der Grund ist nicht kraterförmig. Die übrige Schleimhaut ist glatt und reizlos. Histologisch reicht der Defekt bis zur musc. mucosae. Dort erreicht er eine Arterie und arrodiert deren Wandung. Momentan kommt es zur massiven Blutung. Pathogenetisch sieht Dieulafoy einmal in miliaren Schleimhautabzessen, die in die Magenlichtung durchbrechen und dann vom Magensaft angedaut werden, eine Erklärung für die Erosion. Zum anderen hält er die Erosion für das Initialstadium des Ulcus simplex Cruveilhier, das durch die unstillbare Blutung nicht zur Ausbildung kommt. Dieulafoy hat 10 Fälle gesammelt, 2 davon hat er selbst beobachtet. Einer sei hier wiedergegeben.

Am 13. November 1896 wird ein leichenblaß aussehender junger Mann ins Hotel Dieu de Paris gebracht. Er erzählt mit schwacher Stimme, daß er mehrmals Blut erbrochen habe, etwa 2 - 3 Liter. Zum ersten Mal wurde ihm am Morgen beim Hochheben eines Papierstoßes übel, und er mußte erbrechen. Vor der Blutung habe er niemals Magenschmerzen gehabt, er sei stets gesund gewesen. Bei der Aufnahme hat er einen schwachen Puls und eiskalte Extremitäten. Der Kranke wird mit absoluter Bettruhe, Eisbeuteln auf den Bauch und Ergotininjektionen behandelt. In der Nacht erbricht er erneut Blut, sodaß am Morgen zwei Kuvetten mit flüssigem und verklumptem Blut angefüllt sind. Dieses Mal, wie am Abend vorher, ist das Erbrechen von Pechstühlen begleitet. Auf eine Seruminfusion hin bessert sich der Zustand etwas. Am Mittag kommt es jedoch zu erneuter Hämatemesis, wobei der Kranke verstirbt. Er hat in den 30 Stunden etwa 4 - 5 Liter Blut verloren. Autoptisch finden

sich im Magen noch 1/2 l Blut. 2 cm unterhalb der Kardialia sitzt eine oberflächliche, etwa 5 francs-stück-große Erosion. Der Grund der Erosion zeigt 2 Vertiefungen, in die eine mündet eine arrodierte Arterie.




Abb. 11 Erosion unterhalb der Kardialia.

(Nach Dieulafoy)

Histologisch reicht der Defekt bis zur Mucosa und stellenweise bis in die musc. mucosae. Das arrodierte Gefäß zeigt keine Zeichen einer Erkrankung oder Entzündung, es muß vorher intakt gewesen sein. Die Venen der Umgebung sind thrombosiert und erweitert, sie erklären die roten Flecken, die in der Schleimhaut sichtbar sind. In der Umgebung der Erosion sind kleine miliare Schleimhautabszesse zu erkennen.




Abb. 12 Arrodiertes Gefäß am Grunde einer Erosion.

(Nach Dieulafoy)

Weitere Beobachtungen von akut einsetzenden Magen-Darmblutungen geben: Hirschfeld (1904), Berger (1907), Fritzsche (1919), Scheidegger (1933), Hoelzer (1936), Drabig (1937), Kettler (1939), Krieger (1950), Donaldsen (1950), Albrich (1951), Cornelius (1952), Millard (1955), Leger, Detrie, Arnavielhe und Guyet (1962). Giersberg beschreibt 1962 Patienten mit akuter Hämatemesis. Bei diesen tritt das Bluterbrechen ganz plötzlich ohne Vorboten auf. Die Sektion der Verstorbenen zeigt eine Erosion mit einem arrodierten Gefäß im Fundusbereich des Magens. Histologisch wird der Grund des Schleimhautdefektes von einer fibrinoiden Nekrosezone gebildet. Hindurch läuft eine stark geschlängelte submucöse Arterie, Durchmesser 0,5

- 1,2 mm und Wanddicke 0,25 mm. Die Arterienwand zeigt ein Loch mit ausgefranzten Rändern gegen die Magenlichtung. Die Intima vor und nach dem Loch ist auf der magenwärts gelegenen Seite fibrös verdickt und an manchen Stellen von wandständigen Thromben bedeckt. Die Nekrosezone ist teils akut entzündlich infiltriert, teils ist das Bindegewebe vermehrt.

Weitere Veröffentlichungen von akuten Magen-Darmblutungen stammen von Eck (1962), Wassner (1963), Börger (1963) und Streicher (1964).

B. F r a g e s t e l l u n g.

== =====

Gestützt auf die verschiedenartigen Beschreibungen in der zitierten Literatur und vor allem angeregt durch eine umfangreiche klinische und autoptische Kasuistik, soll in der vorliegenden Arbeit versucht werden, anhand eines reichhaltigen Sektionsgutes mit Hilfe statistischer Methodik zu klären, ob und inwieweit ein Zusammenhang zwischen akuten pathologisch-anatomischen Prozessen verschiedener Körperregionen einerseits und Schleimhautblutungen, Erosionen und Ulcera des Magen-Duodenaltraktes andererseits besteht.

Wir haben folgende akute Prozesse hinsichtlich ihres Zusammenhanges mit MDL untersucht:

Im Kopfbereich: Traumen, Operationen, Massenblutungen, Encephalomalacien, Fettembolien, Meningitiden, Encephalitiden, akutes Hirnödem und Tumoren.

Im Brustbereich: Traumen, Operationen, Lungenembolien, Pleuritiden, Hydrothorax, Pleuracarcinosen, Herzinfarkte und Lungentumoren.

Im Bauchbereich: Traumen, Laparatomien, Peritonitiden, Ascites, Ileus, Peritonealcarcinosen und Tumoren.

Prozesse der vorgenannten Art, die im Rahmen von Blutkrankheiten auftraten, wurden wegen einer eventuellen gesteigerten Blutungsbereitschaft nicht berücksichtigt.

Um die Frage zu klären, ob es Übergänge zwischen Blutungen, Erosionen und Ulcera gibt, soll in der vorliegenden Arbeit über die einfache kausale Verknüpfung hinaus der zeitliche Zusammenhang zwischen den jeweiligen akuten Prozessen und MDL geprüft werden. Des weiteren soll untersucht werden, ob bestimmte Magenregionen bevorzugter Sitz der Schleimhautblutungen sind.

C. M a t e r i a l.

== =====

Der Sektionsjahrgang 1961 des Pathologischen Instituts in Zürich wurde total erfaßt, es handelt sich im ganzen um 2340 Fälle. Davon weisen 1098 das Merkmal "Trauma" oder einen "akuten auslösenden Prozess" (AAP) mit einer Reizung in Kopf-, Brust- und Bauchbereich auf. Bei 923 fehlt dieses Merkmal. 319 Frühgeborene und Säuglinge wurden bei unseren späteren Auswertungen nicht berücksichtigt.

Von den 1098 Fällen mit Prozessen im umseitig definierten Sinn hatten 213 eine Magen-Duodenalläsion (MDL) (Petechien, Erosionen, Ulcera). Bei 885 ließen sich diese Veränderungen nicht nachweisen. Von den genannten 213 Fällen mit MDL konnte bei insgesamt 172 die Zeit vom Einsetzen des auslösenden Prozesses bis zum Tod ermittelt werden, 162 mal entwickelten sich die Läsionen bis zum 12. Tag. Legt man die Grenze am 20. Tag, dann waren es 170.

Zusätzlich wurden im Pathologischen Institut Mainz aus den Jahren 1960 - 64 und im Pathologischen Institut Zürich * aus den Jahren 1960, sowie 1962 - 64 insgesamt 258 Obduktionen mit entsprechenden Prozessen und definiertem Zeitraum ermittelt. Weiterhin wurden aus früheren Jahren und dem Jahr 1965 einzelne entsprechende Todesfälle ausgewertet. Die Zeitspanne zwischen Trauma und Tod betrug in 228 Fällen bis zu 12 Tagen, in 247 Fällen bis zu 20 Tagen.

Nachfolgendes Schema gibt einen Überblick über das erfaßte Sektionsgut.

*) Herrn Professor Dr. med. H. Bredt, Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Mainz, und Herrn Professor Dr. med. E. Uehlinger, Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Zürich, sei an dieser Stelle dafür gedankt, daß ich in die Obduktionsprotokolle Einsicht nehmen durfte.

Jahrgang 1961 Z ü r i c h

mit AAP	ohne AAP	Frühge- borene u. Säuglinge
1098	923	319
alle		
2340		
=====		

mit Magen- Darmläsion	ohne Magen- Darmläsion
213	885
mit zeitlich definiertem Prozess	ohne zeitlich definierten Prozess
172	41

bis 12 Tage bis 20 Tage mehr als
begrenzt begrenzt 20 Tage

162 8 2

Jahrgang 1960 - 64 M a i n z + Z ü r i c h 1960 und 1962 - 64

mit auslösenden Prozessen und MDL

258

bis 12 Tage begrenzt	bis 20 Tage begrenzt
228	19

Für unsere Untersuchungen über den zeitlichen Zusammenhang standen uns insgesamt 391 (bis zu 12 Tagen) und 419 (bis zu 20 Tagen) Todesfälle zur Verfügung. 3 Verbrennungen kamen noch hinzu.

Die Protokolle von 474 Sektionen wurden von uns hinsichtlich der Topik der Schleimhautschädigungen ausgewertet, es handelt sich dabei um 216 Fälle aus Zürich 1961 und um 258 aus den Jahrgängen 1960 - 64 Mainz und 1960 und 1962 - 64 Zürich.

Um vor allem aber den Zusammenhang zwischen Schleimhautveränderung und zugrunde liegendem Krankheitsprozess zu ermitteln, haben wir 1098 Sektionen des Jahres 1961 Zürich nach diagnostischen Gruppen aufgegliedert und ausgewertet. Die Tabellen 1, 2 und 3 geben die Verteilung dieser Fälle nach Alter, Geschlecht und Lokalisation des auslösenden Prozesses wieder.

Tabelle 1

Verteilung der Fälle mit zeitlich definierbarem auslösenden Prozeß nach Alter, Lokalisation des auslösenden Prozesses und Geschlecht

	Männer					Frauen					Zusammen				
	Kopf	Brust	Bauch	Komb. Trau- men und Ver- bren- nungen	Ins- ge- samt	Kopf	Brust	Bauch	Komb. Trau- men und Ver- bren- nungen	Ins- ge- samt	Kopf	Brust	Bauch	Komb. Trau- men und Ver- bren- nungen	Ins- ge- samt
Vollendete Lebensjahre															
1 - 50	68 * (71)	18 (19)	15 (16)	18 (21)	119 (127)	20 (20)	4 (4)	8 (11)	1 (1)	33 (36)	88 (91)	22 (23)	23 (27)	19 (22)	152 (163)
51 - 100	74 (80)	49 (50)	29 (34)	6 (6)	158 (170)	40 (42)	25 (25)	16 (19)		81 (86)	114 (122)	74 (75)	45 (53)	6 (6)	239 (256)
Zusammen	142 (151)	67 (69)	44 (50)	24 (27)	277 (297)	60 (62)	29 (29)	24 (30)	1 (1)	114 (122)	202 (213)	96 (98)	68 (80)	25 (28)	391 (419)

* Ohne Klammer: Zahl der Fälle mit einem zeitlichen Abstand zwischen auslösendem Ereignis und Tod bis zum 12. Tag.
Mit Klammer: bis zum 20. Tag.

Tabelle 2

Verteilung der Fälle mit auswertbarem Sitz der Schleimhautläsion im Magen-Darmbereich
auf Alter, Lokalisation des auslösenden Prozesses und Geschlecht

	Männer					Frauen					Zusammen				
	Kopf	Brust	Bauch	Komb. Trau- men und Ver- bren- nungen	Ins- ge- samt	Kopf	Brust	Bauch	Komb. Trau- men und Ver- bren- nungen	Ins- ge- samt	Kopf	Brust	Bauch	Komb. Trau- men und Ver- bren- nungen	Ins- ge- samt
Vollendete Lebensjahre															
1 - 50	75	22	18	22	137	23	4	15	1	43	98	26	33	23	180
51 - 100	87	57	39	8	191	45	33	24	1	103	132	90	63	9	294
Zusammen	162	79	57	30	328	68	37	39	2	146	230	116	96	32	474

Sämtliche Obduktionsfälle mit MDL aus dem Jahrgang 1961 des Pathologischen
Instituts Zürich

A A P im Kopfbereich

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z *)	30	62 ♂	Encephalomalacie	4 Tage	Multiple Erosionen	3
Z	32	30 ♂	Terminaler Hirndruck durch Schädelhirn- trauma	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	44	80 ♂	Encephalomalacie	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	47	43 ♂	Terminaler Hirndruck d. Schädelhirntrauma	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	51	60 ♂	Tumormetastasen in der Schädelkalotte und Dura	?	Petechiale Blutungen	1234
Z	63	60 ♂	Schädelhirntrauma d. Unfall	14 Tage	Multiple Erosionen	14
Z	162	72 ♂	Hirnmassenblutung	3 Tage	Petechiale Blutungen	14
Z	195	71 ♂	Schädelhirntrauma	5 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	211	78 ♀	Encephalomalacie	2 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	240	26 ♂	Kopfschuß	2 Tage	Ulcerper- foration	1
Z	253	72 ♂	Encephalomalacie	?	Petechiale Blutungen	4
Z	265	9 ♂	Extirpation eines Hirnabszesses	2 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	270	30 ♂	Kraniotomie zur Ent- fernung eines Aneu- rysmas d. A. Car. int.	1 Tag	Multiple Erosionen	14
Z	355	71 ♀	Fettembolie im Ge- hirn	4 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	366	75 ♂	Encephalomalacie	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
Z	369	60 ♀	Hirnmassenblutung	5 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	378	35 ♂	Schädelhirntrauma	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	384	59 ♂	Hirnmassenblutung	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	433	69 ♀	Hirnmassenblutung	2 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	478	37 ♀	Extirpation eines Kraniopharyngioms	2 Tage	Multiple Erosionen	1234
Z	486	67 ♂	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	4

*) Z = Zürich

•) s. Taf. 11

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	488	74 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Multiple Erosionen	13
Z	500	75 ♀	Encephalomalacie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	511	60 ♀	Encephalomalacie	5 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	519	59 ♀	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Multiple Erosionen	123
Z	606	62 ♂	Carcinomrezidiv an der Schädelbasis	?	Petechiale Blutungen	1234
Z	608	1 1/2 ♀	Hirnrödem nach epileptiformen Krämpfen	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	611	75 ♀	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	4
Z	647	66 ♂	Encephalomalacie	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	693	36 ♂	Gliom	?	Petechiale Blutungen	4
Z	701	42 ♀	Hirnrödem im Status epilepticus	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	720	38 ♀	Meningitis	?	Petechiale Blutungen	123
Z	752	86 ♂	Encephalomalacie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	782	51 ♀	Hirnrödem bei Paralysis agitans	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	789	54 ♂	Extirpation eines Oligodendroglioms	5 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	791	52 ♂	Leptomeningitis	?	Petechiale Blutungen	1234
Z	806	56 ♂	Glioblastomrezidiv	?	Petechiale Blutungen	123
Z	836	49 ♂	Aneurysmaruptur an der A. com. ant.	1 Tag	Multiple Erosionen	4
Z	853	75 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	894	40 ♂	Hirnmassenblutung	5 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	901	72 ♀	Koagulation im Thalamus bei M. Parkinson	2 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	912	73 ♂	Encephalomalacie	3 Tage	Multiple Erosionen	3
Z	963	54 ♀	Schädelhirntrauma	1 Tag	Petechiale Blutungen	4
Z	967	45 ♂	Hirnrödem	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	974	60 ♀	Encephalomyelitis und Encephalomalacie des Occipitallappens	?	Ulcerperforation	4

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	985	26 ♂	Meningitis Tbc	6 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1016	67 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	16 Tage	Ulcus	4
Z	1022	40 ♀	Encephalomalacie	3 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1031	73 ♂	Schädelhirntrauma	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1063	63 ♂	Encephalomalacie	7 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1085	17 ♂	Resektion eines Hypophysenadenoms	5 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	1086	31 ♀	Hirnödem im eklamptischen Anfall	1 Tag	Multiple Erosionen	4
Z	1098	63 ♂	Encephalomalacie	3 Tage	Multiple Erosionen	3
Z	1127	66 ♂	Encephalomalacie	3 Tage	Multiple Erosionen	3
Z	1139	19 ♂	Tumormetastasen in der Schädelkalotte	?	Multiple Erosionen	4
Z	1146	61 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	Stunden	Petechiale Blutungen	4
Z	1172	56 ♂	Encephalomalacie	2 Tage	Petechiale Blutungen	12
Z	1176	61 ♂	Carcinommetastasen in Kleinhirn und Medulla	?	Multiple Erosionen	4
Z	1205	60 ♂	Aneurysmaruptur der A. cer. ant.	1 Tag	Multiple Erosionen	2
Z	1209	59 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	5 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1224	1 Mon. ♂	Kraniotomie zur Entfernung eines Subduralhämatoms	Stunden	Multiple Erosionen	123
Z	1237	61 ♂	Encephalomalacie	2 Tage	Ulcus	4
Z	1220	60 ♂	Carotisangiographie bei Glioblastom	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	1260	60 ♂	Punktion eines Glioblastoms	2 Tage	Petechiale Blutungen	12
Z	1268	52 ♂	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	12
Z	1281	62 ♂	Subarachnoidalblutung	15 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	1323	55 ♀	Mikroencephalorrhagien in die Stammganglien	?	Multiple Erosionen	4
Z	1331	65 ♀	Encephalomalacie	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1373	63 ♀	Encephalomalacie	5 Tage	Petechiale Blutungen	1234

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	1376	55 ♂	Encephalomalacie	8 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1455	51 ♂	Subarachnoidalblutung	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1493	54 ♂	Akutes Hirnödeme	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1531	4 ♂	Extirpation eines Kleinhirntumors	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1617	74 ♀	Encephalomalacie	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1620	83 ♂	Hirnmassenblutung	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1741	84 ♀	Encephalomalacie	11 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1831	80 ♀	Encephalomalacie	3 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1873	41/2 ♂	Akutes Hirnödeme	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1904	28 ♂	Polioencephalitis	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1919	56 ♂	Schädelhirntrauma	7 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	1929	47 ♀	Hirnmassenblutung	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1963	51 ♀	Hirnventrikelblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
Z	2053	28 ♂	Extirpation eines Klein- hirnbrückenwinkeltumors	14 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	2016	43 ♂	Schädelhirntrauma	7 Tage	Ulcus4	4
Z	2073	64 ♀	Encephalomalacie	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	2114	58 ♂	Schädelhirntrauma	7 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	2146	23 ♀	Extirpation eines Acusticusneurinoms	Stunden	Multiple Erosionen	123
Z	2189	63 ♀	Aneurysmaruptur an der A. cer. ant.	10 Tage	Petechiale Blutungen	1234
Z	2208	62 ♂	Hirnödeme	8 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	2222	62 ♀	Encephalomalacie	2 Tage	Petechiale Blutungen	1
Z	2275	51 ♀	Akutes Hirnödeme	Stunden	Petechiale Blutungen	4
Z	2337	82 ♀	Hirnmassenblutung	9 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	2196	12 ♀	Kraniotomie wegen Ara- chnoidalzyste	25 Tage	Ulcusper- foration	4

A A P im Brustbereich

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	24	67 ♂	Pleuraerguß bei Bronchialcarcinom	?	Petechiale Blutungen	4
Z	43	64 ♂	Lungenembolie	3 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	45	66 ♀	Pleuracarcinose bei Schilddrüsenkarzinom	?	Multiple Erosionen	123
Z	48	71 ♂	Herzinfarkt	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	75	54 ♀	Lungenembolie	2 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	83	68 ♂	Lungenembolie	1 Tag	Multiple Erosionen	12
Z	99	64 ♀	Lungenembolie	1 Tag	Multiple Erosionen	123
Z	188	76 ♂	Lungenembolie	5 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	194	50 ♀	Pleuraerguß bei Mammacarcinom	?	Multiple Erosionen	2
Z	212	75 ♀	Hydrothorax bei Reticulumzellsarkom	?	Petechiale Blutungen	1234
Z	230	78 ♂	Herzinfarkt	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	251	68 ♀	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	342	62 ♂	Herzinfarkt	1 Tag	Multiple Erosionen	4
Z	396	59 ♀	Strumektomie	4 Tage	Petechiale Blutungen	4
Z	413	26 ♂	Stumpfes Brusttrauma	23 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	429	55 ♀	Lungenembolie	2 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	434	58 ♀	Herzinfarkt	4 Tage	Multiple Erosionen	1234
Z	499	76 ♀	Herzinfarkt	5 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	485	67 ♀	Lungenembolie	?	Multiple Erosionen	3
Z	503	69 ♂	Herzinfarkt	1 Tag	Erosion	4
Z	556	63 ♀	Pleuracarcinose bei Mammacarcinom	?	Petechiale Blutungen	123
Z	583	56 ♂	Bronchialcarcinom	?	Multiple Erosionen	4
Z	615	71 ♂	Thoracotomie und Herzmassage	2 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	624	60 ♂	Lungenembolie	1 Tag	Multiple Erosionen	34

Ort	Sektionsnummer	Alter	A AP	Intervall	Befund	Loci
Z	697	66 ♂	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	2
Z	700	74 ♂	Pleuracarcinose bei Valleculacarcinom	?	Multiple Erosionen	1234
Z	769	83 ♀	Herzinfarkt	2 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	787	76 ♀	Herzinfarkt	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	812	63 ♂	Herzinfarkt	Stunden	Multiple Erosionen	3
Z	816	44 ♂	Stumpfes Brusttrauma	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	820	68 ♂	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	911	66 ♂	Herzinfarkt	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
Z	920	72 ♀	Herzinfarkt	1 Tag	Multiple Erosionen	4
Z	964	64 ♂	Thoracotomie wegen Bronchialcarcinom	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
Z	993	58 ♂	Lungenembolie	2 Tage	Multiple Erosionen	24
Z	1008	71 ♀	Hydrothorax bei Mammacarcinom	?	Petechiale Blutungen	123
Z	1045	59 ♂	Thoracotomie und Herzmassage	7 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1046	67 ♂	Hydrothorax	?	Multiple Erosionen	123
Z	1060	80 ♀	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1061	81 ♀	Herzinfarkt	Stunden	Multiple Erosionen	34
Z	1122	93 ♀	Lungenembolie	2 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1143	72 ♂	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	4
	1160	80 ♀	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1182	65 ♀	Lungenembolie	1 Tag	Petechiale Blutungen	1
Z	1243	75 ♀	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1313	77 ♀	Pleuracarcinose	?	Multiple Erosionen	4
Z	1318	73 ♂	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1427	52 ♂	Thoracotomie	3 Tage	Multiple Erosionen	123

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	1463	64 ♂	Herzinfarkt	Stunden	Multiple Erosionen	4
Z	1480	31 ♀	Operativer Verschluß eines Septumdefektes am Herzen	8 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	1500	25 ♂	Thoracotomie zur Sprengung einer Pulmonalstenose	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1509	59 ♂	Lungenembolie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	1585	82 ♂	Lungenembolie	4 Tage	Ulcera	123
Z	1596	67 ♀	Lungenembolie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	1629	76 ♂	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1638	19 ♂	Bolustod - Verschlucken an Wurst	Stunden	Petechiale Blutungen	1234
Z	1654	70 ♂	Herzinfarkt	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1666	22 ♂	Operative Korrektur der Aortenklappe	5 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1673	72 ♂	Pleuracarcinose	?	Multiple Erosionen	123
Z	1825	85 ♂	Hydrothorax	?	Multiple Erosionen	123
Z	1900	73 ♀	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	4
Z	1984	84 ♂	Herzinfarkt	1 Tag	Multiple Erosionen	123
Z	1998	61 ♂	Thoracotomie wegen Ösophaguscarcinom	7 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	2063	36 ♀	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	4
Z	2065	78 ♀	Bronchialcarcinom	?	Petechiale Blutungen	123
Z	2133	60 ♀	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	2138	62 ♂	Lobektomie wegen Bronchialcarcinom	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	2185	77 ♂	Lungenembolie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	2216	32 ♂	Lobektomie wegen Tbc	4 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	2241	70 ♀	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	2279	62 ♂	Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	4
Z	2318	84 ♂	Stumpfes Brusttrauma	3 Tag	Petechiale Blutungen	123

A A P im Bauchbereich

Urt	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	35	51 ♀	Peritonitis	2 Tage	Multiple Erosionen	24
Z	134	52 ♀	Peritonitis durch incarcerierte Nabelhernie	3 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	143	41 ♀	Peritonealcarcinose bei Mammacarcinom	?	Petechiale Blutungen	123
Z	179	60 ♂	Ascites bei Prostatacarcinom	?	Multiple Erosionen	123
Z	246	47 ♂	Nephrostomie	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
Z	272	6 ♂	Ureterimplantation und Ileostomie	5 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	333	73 ♂	Peritonealcarcinose bei Rectumcarcinom	?	Petechiale Blutungen	123
Z	367	68 ♂	Embolie der A. mesent. sup.	Stunden	Multiple Erosionen	1
Z	492	52 ♀	Peritonitis	3 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	554	64 ♀	Peritonitis	5 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	593	43 ♀	Peritonitis	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	595	15 ♀	Dünndarmvolvulus	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	617	57 ♀	Ileus	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	667	61 ♂	Peritonitis	4 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	707	76 ♂	Peritonitis	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
Z	813	79 ♀	Peritonealcarcinose	?	Petechiale Blutungen	123
Z	841	68 ♂	Peritonitis	10 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	873	76 ♂	Peritonitis	5 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1040	70 ♀	Laparatomie wegen Darmcarcinoid	2 Tage	Multiple Erosionen	1234
Z	1068	70 ♂	Peritonitis	4 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1192	62 ♂	Extirpation eines retroperitonealen Abszesses	3 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1213	45 ♀	Ascites bei Mammacarcinom	?	Multiple Erosionen	123
Z	1251	78 ♀	Stumpfes Bauchtrauma	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1287	74 ♂	Peritonitis	13 Tage	Multiple Erosionen	123

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	1367	49 ♀	Peritonitis	7 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1369	76 ♀	Peritonitis	6 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	1377	58 ♀	Nephrostomie	6 Tage	Multiple Erosionen	12
Z	1424	41 ♀	Peritonealcarcinose	?	Multiple Erosionen	123
Z	1450	19 ♀	Ascites bei Herzfehler	?	Petechiale Blutungen	123
Z	1487	31 ♂	Peritonitis	5 Tage	Ulcusper- foration	4
Z	1501	41 ♂	Peritonitis	13 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1669	61 ♂	Peritonitis	?	Multiple Erosionen	123
Z	1681	44 ♂	Peritonitis	6 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1711	77 ♂	Peritonitis	3 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	1744	91 ♀	Laparatomie wegen Ileus	8 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1769	74 ♀	Ovarialcarcinom	?	Multiple Erosionen	123
Z	1775	74 ♀	Ascites	?	Multiple Erosionen	4
Z	1778	67 ♀	Peritonitis	6 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1816	4 ♂	Peritonitis	?	Multiple Erosionen	123
Z	1863	72 ♀	Peritonitis	13 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1868	65 ♂	Peritonitis	7 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1881	67 ♂	Peritonealcarcinose	?	Petechiale Blutungen	123
Z	1925	73 ♀	Peritonealcarcinose	?	Multiple Erosionen	123
Z	1934	72 ♀	Nephrostomie	15 Tage	Multiple Erosionen	1234
Z	2198	62 ♀	Peritonealcarcinose	?	Multiple Erosionen	3
Z	2296	77 ♂	Peritonitis	?	Petechiale Blutungen	1234

MDL nach Verbrennung

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	1643	37 ♂	Verbrennung 1., 2., 3. Grades, 55 % der Körperoberfläche	14 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1896	51 ♂	Verbrennung 3. Grades	31 Tage	4 Ulcera	4
Z	1936	70 ♂	Verbrennung 1. und 2. Grades, 95 % der Körperoberfläche	1 Tag	Petechiale Blutungen	123

MDL ohne A A P

Z	7	79 ♂	Verbluten aus Erosionen			123
Z	943	43 ♂	Petechiale Blutungen			1234
Z	1188	55 ♂	Multiple Erosionen			1234
Z	1320	60 ♂	Multiple Erosionen			123
Z	1665	89 ♀	Petechiale Blutungen			1234
Z	1682	79 ♂	Multiple Erosionen			2
Z	1760	67 ♂	Multiple Erosionen			123
Z	1864	70 ♀	Petechiale Blutungen			123

Obduktionsfälle mit MDL aus den Jahrgängen 1960 bis 1964 Mainz und
1960, 1962 bis 1964 Zürich
 (einige Fälle aus vorangehenden Jahren)

A A P im Kopfbereich

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
M*)	372/57	33 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	2
M	121/58	64 ♀	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
M	123/58	72 ♂	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
M	141/58	3 ♂	Extirpation eines Hirntumors	Stunden	Petechiale Blutungen	123
M	387/58	81 ♂	Schädeltrauma	13 Tage	Ulcus	4
M	453/58	12 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	3 Tage	Petechiale Blutungen	2
M	486/58	50 ♂	Schädeltrauma	1 Tag	Petechiale Blutungen	1
M	398/60	61 ♂	Leptomeningitis	2 Tage	Petechiale Blutungen	1
M	538/60	38 ♀	Ventrikulographie bei Oligodendrogliom	1 Tag	Petechiale Blutungen	14
M	558/60	57 ♂	Carotisangiographie bei Glioblastom	1 Tag	Multiple Erosionen	4
M	43/60	26 ♂	Trepanation bei Arachniti- tis chron. adhäsiva	10 Tage	Multiple Erosionen	3
M	94 /60	25 ♂	Schädeltrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	300/60	65 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	Stunden	Petechiale Blutungen	1
M	242/60	31 ♂	Schädeltrauma durch Sturz	5 Tage	Multiple Erosionen	3
M	215/60	63 ♀	Schädeltrauma durch Sturz	Stunden	Petechiale Blutungen	123
M	202/60	59 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
M	199/60	12 ♂ Mon.	Meningitis	12 Tage	Multiple Erosionen	123
M	503/60	61 ♂	Resektion eines Glioblastomrezidivs	3 Tage	Petechiale Blutungen	2
M	523/60	52 ♂	Resektion eines Glioblastoms	9 Tage	Petechiale Blutungen	1
M	525/60	25 ♂	Meningitis	15 Tage	Multiple Erosionen	1234
M	343/60	24 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	4 Tage	Petechiale Blutungen	1

*) M = Mainz, Z = Zürich

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
m	413/60	56 ♂	Carotisangiographie bei Kleinhirnstrocytom	5 Tage	Multiple Erosionen	3
m	438/60	29 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	1 Tag	Petechiale Blutungen	1
m	444/60	45 ♂	Kleinhirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
m	471/60	63 ♂	Polyneuritis von Lan- dryscher Verlaufsform	5 Tage	Multiple Erosionen	1
m	38/61	57 ♂	Leptomeningitis	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	49/61	55 ♂	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
m	418/61	38 ♂	Delirium tremens	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	315/61	45 ♂	Resektion eines Glio- blastoms	3 Tage	Petechiale Blutungen	12
m	344/61	56 ♂	Schädeltrauma durch Sturz	Stunden	Multiple Erosionen	3
m	391/61	76 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	394/61	67 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	1
m	646/61	22 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	123
m	6/62	1 ♀ 10 Mon.	Resektion eines Medullo- blastoms	5 Tage	Petechiale Blutungen	4
m	206/62	38 ♂	Hirnmassenblutung	7 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	209/62	43 ♂	Resektion eines Glio- blastoms	9 Tage	Ulcus	4
m	211/62	39 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	4 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	274/62	51 ♂	Encephalomalacie	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	284/62	53 ♀	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
m	145/62	41 ♂	Schädeltrepanation bei Oligodendrogliom	5 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	308/62	56 ♂	Delirium tremens	8 Tage	Erosion	4
m	334/62	60 ♀	Encephalomalacie	4 Tage	Petechiale Blutungen	1234
m	387/62	54 ♂	Encephalomalacie	3 Tage	Petechiale Blutungen	12
m	408/62	23 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	10 Tage	Multiple Erosionen	123
m	495/62	82 ♂	Hirnmassenblutung	2 Tage	Kissing Ulcers	3

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
m	553/62	59 ♀	Aneurysmablutung aus d. A. cer. med.	1 Tag	Petechiale Blutungen	4
m	570/62	66 ♀	Encephalomalacie	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	585/62	57 ♀	Schädelhirntrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	1
m	701/62	38 ♀	Carotisangiographie bei Hirnabszess	5 Tage	Multiple Erosionen	123
m	712/62	56 ♂	Kopfschuß	15 Tage	Ulcus	4
m	734/62	19 ♂	Resektion eines Hirnabszesses	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	748/62	46 ♂	Hirnmassenblutung	10 Tage	Ulcus	4
m	773/62	28 ♂	Schädeltrauma durch Sturz	1 Tag	Petechiale Blutungen	4
m	775/62	55 ♂	Hirnmassenblutung	1 Tag	Erosion	3
m	606/62	82 ♀	Hirnmassenblutung	24 Tage	Ulcus	4
m	677/62	36 ♂	Resektion eines Kraniopharyngioms	4 Tage	Erosion	4
m	20/63	65 ♀	Encephalomalacie	18 Tage	Multiple Erosionen	1
m	47/63	80 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	4 Tage	Multiple Erosionen	34
m	54/63	70 ♂	Hirnmassenblutung	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
m	77/63	42 ♂	Resektion eines Meningeoms	5 Tage	Petechiale Blutungen	34
m	219/63	32 ♀	Hirnmassenblutung	3 Tage	Petechiale Blutungen	4
m	252/63	45 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
m	281/63	34 ♀	Hirndruck bei Hypophysenadenom	3 Tage	Petechiale Blutungen	1234
m	285/63	56 ♀	Extirpation eines Acusticusneurinoms	14 Tage	Mehrere Ulcera	123
m	110/63	19 ♂	Subarachnoidalblutung	7 Tage	Ulcus	4
m	127/63	59 ♀	Resektion eines Acusticusneurinoms	4 Tage	Petechiale Blutungen	123
m	196/63	70 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	123
m	197/63	51 ♀	Hirnmassenblutung	Stunden	Petechiale Blutungen	123
m	303/63	43 ♂	Hirnmassenblutung	Stunden	Petechiale Blutungen	12
m	327/63	25 ♂	Hirndruck bei Spongioblastom	5 Tage	Multiple Erosionen	1
m	354/63	52 ♂	Hirnodem im Leberkoma	2 Tage	Multiple Erosionen	123

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
M	377/63	28 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	7 Tage	Petechiale Blutungen	1234
M	380/63	73 ♂	Trepanation bei Pachy- meningiosis häm. int.	13 Tage	Erosion	4
M	658/63	60 ♀	Schädelhirntrauma durch Unfall	6 Tage	Ulcus	3
M	662/63	56 ♂	Ruptur eines Aneurys- mas d. A. cer. ant.	Stunden	Petechiale Blutungen	1234
M	40/64	57 ♀	Hirnmassenblutung	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	63/64	51 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	11 Tage	Petechiale Blutungen	1234
M	69/64	42 ♀	Meningoencephalitis	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
M	118/64	41 ♂	Leptomeningitis	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
M	168/64	60 ♂	Hirnmassenblutung	4 Tage	Petechiale Blutungen	1
M	169/64	50 ♂	Fettembolie im Gehirn nach Unfall	6 Tage	Multiple Erosionen	123
M	171/64	40 ♂	Operation eines Hirn- aneurysmas	7 Tage	Multiple Erosionen	2
M	408/63	16 ♀	Ventrikeldrainage bei Medulloblastom	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
M	421/63	31 ♀	Polioencephalitis	27 Tage	Ulcus	4
M	430/63	60 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
M	431/63	60 ♂	Hirnmassenblutung	5 Tage	Multiple Erosionen	4
M	438/63	12 ♂	Meningitis	3 Tage	Petechiale Blutungen	2
M	442/63	14 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	4
M	446/63	68 ♀	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	1234
M	463/63	50 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	66 Tage	Penetrieren- des Ulcus	4
M	474/63	61 ♂	Resektion eines Hypo- physenadenoms	25 Tage	Penetrieren- de Ulcera	4
M	236/64	17 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	1
M	307/64	35 ♂	Trepanation wegen Ependymom	40 Tage	Ulcus	4
M	322/64	32 ♀	Encephalomalacie	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
M	433/64	52 ♀	Hirnmassenblutung	3 Tage	Petechiale Blutungen	4

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
M	552/64	78 ♂	Encephalomalacie	4 Tage	Erosionen	1234
M	582/64	68 ♀	Meningitis	4 Tage	Erosion	2
M	625/64	35 ♀	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	123
M	725/64	17 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
M	471/64	40 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
M	332/64	28 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	2 Tage	Multiple Erosionen	3
M	651/64	35 ♂	Hirnmassenblutung	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
M	733/64	39 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	4 Tage	Multiple Erosionen	1
M	592/64	27 ♀	Extirpation eines Hypophysenadenoms	5 Tage	Ulcus	2
M	30/64	32 ♂	Aneurysmaruptur an d. A. cer. med.	Stunden	Multiple Erosionen	123
M	791/64	41 ♂	Resektion eines Oligodendroglioms	9 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	1960/60	44 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	20 Tage	Multiple Erosionen	1234
Z	1226/60	50 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	4 Tage	2 Ulcera	3
Z	249/60	63 ♂	Kraniotomie wegen Aneurysmaruptur der A. cer. med.	6 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	2317/60	50 ♂	Resektion eines Astrocytoms	5 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1866/60	47 ♂	Encephalomalacie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	1083/60	64 ♂	Hirnmassenblutung mit Ventrikeldurchbruch	1 Tag	Multiple Erosionen	123
Z	193/60	68 ♂	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	147/60	57 ♀	Aneurysmaruptur der A. cer. med.	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1996/60	57 ♂	Encephalorrhagie u. Encephalomalacie nach epileptischem Anfall	5 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	759/60	61 ♀	Encephalorrhagie und Encephalomalacie	4 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1844/62	51 ♂	Kraniotomie wegen Reticuloangiom	7 Tage	Ulcera	4
Z	1031/62	51 ♀	Kraniotomie wegen Hirnaneurysma	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
Z	725/62	32 ♂	Extirpation eines Ependymoms	2 Tage	Petechiale Blutungen	4

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
Z	448/62	51 ♂	Elektrokoagulation eines Thalamuskern bei M. Parkinson	9 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1079/60	35 ♀	Schädelhirntrauma durch Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	224/60	68 ♂	Terminaler Hirndruck bei Schädeltrauma	Stunden	Petechiale Blutungen	123
Z	1452/63	50 ♂	Schädeltrauma durch Sturz	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	1447/63	17 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	4 Tage	Multiple Erosionen	12
Z	1258/63	44 ♀	Kraniotomie wegen Astrocytom	5 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1123/63	62 ♀	Hirnmassenblutung	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
Z	646/63	64 ♀	Hirnmassenblutung	3 Tage	Ulcera	4
Z	193/63	56 ♂	Hirnmassenblutung	5 Tage	2 Ulcera	4
Z	952/63	70 ♂	Hirnmassenblutung	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	2055/63	70 ♂	Aneurysmaruptur der A. com. ant.	6 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	1880/63	56 ♂	Kopfschuß	3 Tage	Ulcus	4
Z	1733/63	32 ♂	Schädelhirntrauma durch Sturz	4 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	16/63	40 ♂	Aneurysmaruptur der A. basilaris	10 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1163/64	58 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	4 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	1995/64	57 ♂	Encephalomalacie	4 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	2087/64	61 ♂	Schädelhirntrauma durch Unfall	5 Tage	Ulcusperforation	4
Z	2173/64	16 ♂	Fettembolie im Gehirn	11 Tage	Multiple Erosionen	3

A A P im Brustbereich

lit	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
M	537/60	44 ♂	Aortenruptur	2 Tage	Multiple Erosionen	2
M	555/60	17 ♂	Thoracotomie bei Poliom. acute ant.	Stunden	Petechiale Blutungen	1
M	527/60	34 ♂	Stumpfes Brusttrauma durch Unfall	1 Tag	Petechiale Blutungen	14
M	535/60	65 ♂	Herzinfarkt	5 Tage	Ulcusperforation	3
M	623/61	45 ♂	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	1
M	248/62	34 ♂	Stumpfes Brusttrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	267/62	35 ♂	Abriß einer Taschenklappe der Aorta	Stunden	1 Erosion	4
M	273/62	58 ♂	Herzinfarkt	Stunden	Multiple Erosionen	123
M	111/62	60 ♂	Fulminante Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	14
M	461/62	49 ♂	Thoracotomie wegen Bronchialcarcinom	10 Tage	Ulcus	4
M	593/62	51 ♂	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	14
M	761/62	53 ♂	Fulminante Lungenembolie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
M	811/62	63 ♂	Lobektomie wegen Bronchialcarcinom	16 Tage	Ulcus	4
M	826/62	80 ♂	Herzinfarkt	5 Tage	Multiple Erosionen	4
M	642/62	71 ♀	Fulminante Lungenembolie	1 Tag	Petechiale Blutungen	123
M	74/63	59 ♂	Herzinfarkt	1 Tag	Multiple Erosionen	123
M	226/63	59 ♀	Ruptur eines Aneurysmas der A. pulmonalis	Stunden	Petechiale Blutungen	1234
M	181/63	67 ♂	Herzinfarkt	3 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	311/63	19 ♂	Fulminante Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	123
M	392/63	57 ♂	Herzinfarkt	1 Tag	Petechiale Blutungen	1234
M	610/63	73 ♂	Herzinfarkt	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	645/63	41 ♂	Herzinfarkt	Stunden	Petechiale Blutungen	4
M	286/64	41 ♂	Fulminante Lungenembolie	Stunden	Petechiale Blutungen	1234
M	573/64	44 ♀	Mitralkleppensprengung	2 Tage	Multiple Erosionen	2

Ort	Sektions- nummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loc1
B	445/64	47 ♂	Herzinfarkt	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
B	562/64	67 ♀	Fulminante Lungenem- bolie	1 Tag	Petechiale Blutungen	12
B	769/64	57 ♀	Fulminante Lungenem- bolie	2 Tage	Petechiale Blutungen	12
B	670/64	57 ♂	Herzinfarkt	2 Tage	Petechiale Blutungen	1
B	845/64	71 ♂	Rezidivierende Herz- infarkte	6 Tage	Multiple Erosionen	3
B	732/63	48 ♂	Pneumektomie wegen Bronchialcarcinom	13 Tage	Multiple Erosionen	3
B	205/58	62 ♂	Thoraxkontusion durch Unfall	2 Tage	Multiple Erosionen	3
Z	1087/63	75 ♂	Rezidivierende Lun- genembolie	6 Tage	Ulcera	2
Z	1950/62	59 ♂	Pneumothorax bei Lun- gentuberkulose	2 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	1666/62	22 ♂	Operative Korrektur einer Herzklappenin- suffizienz	5 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	639/62	51 ♂	Rezidivierende Herz- infarkte	26 Tage	Ulcus	4
Z	1695/64	39 ♂	Operative Sprengung der Mitralklappe	3 Tage	2 Ulcera	4
Z	834/63	58 ♀	Ersticken im Status asthmaticus	2 Tage	Ulcera	4
Z	573/63	75 ♂	Thoraxkontusion durch Fensterprung	Stunden	Multiple Erosionen	1
Z	1890/63	59 ♂	Fulminante Lungenem- bolie	1 Tag	Multiple Erosionen	4
Z	1494/63	65 ♂	Ruptur der Herzkam- merwand	Stunden	Multiple Erosionen	4
Z	2326/64	32 ♂	Operation einer Aor- tenruptur	32 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	1708/59	60 ♂	Thoracotomie und De- cortication d.Lunge	6 Tage	Ulcusper- foration	4

A A P im Bauchbereich

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loc
M	286/60	38 ♀	Sectio caesarea	Stunden	Multiple Erosionen	12
M	507/60	57 ♂	Laperatomie wegen Pankreasnekrose	4 Tage	Multiple Erosionen	3
M	522/60	55 ♂	Laparatomie wegen Ileus	2 Tage	1 Erosion	1
M	366/60	65 ♂	Laparatomie wegen paralytischem Ileus	2 Tage	Multiple Erosionen	1
M	360/61	64 ♂	Darmresektion wegen Diverticulitis	15 Tage	1 Erosion	2
M	34/62	79 ♂	Prostatektomie	4 Tage	Petechiale Blutungen	2
M	304/62	23 ♀	Peritonitis	15 Tage	1 Erosion	4
M	486/62	69 ♂	Peritonitis	5 Tage	Ulcus	4
M	516/62	64 ♂	Peritonitis	3 Tage	1 Erosion	4
M	547/62	26 ♂	Stumpfes Bauchtrauma durch Unfall	2 Tage	Ulcus3	2
M	702/62	48 ♀	Peritonitis	4 Tage	Multiple Erosionen	123
M	34/63	52 ♂	Laparatomie wegen akuter Pankreasnekrose	2 Tage	Multiple Erosionen	3
M	40/63	55 ♀	Operation eines Rectumcarcinoms	5 Tage	Multiple Erosionen	1
M	93/63	80 ♂	Peritonitis	4 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	94/63	70 ♀	Peritonitis	2 Tage	Multiple Erosionen	123
M	205/63	61 ♂	Cholecystektomie	20 Tage	Ulcera	2
M	270/63	42 ♀	Peritonitis	5 Tage3	Petechiale Blutungen	123
M	296/63	75 ♀	Peritonitis	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	112/63	61 ♂	Peritonitis	6 Tage	1 Erosion	3
M	694/63	80 ♂	Peritonitis bei perfor. Appendizitis	3 Tage	Multiple Erosionen	3
M	139/64	75 ♀	Peritonitis	2 Tage	Petechiale Blutungen	1
M	164/64	73 ♂	Peritonitis	8 Tage	Ulcera	1
M	434/63	36 ♀	Peritonitis	15 Tage	Ulcera	4
M	439/63	14 ♂ Mon.	Peritonitis	35 Tage	Ulcusperforation	4
M	231/64	54 ♂	Peritonitis	17 Tage	Multiple Erosionen	123
M	274/64	74 ♀	Peritonitis bei chron. Cholecystitis	7 Tage	Multiple Erosionen	1234

Urt	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loc1
M	357/64	47 ♂	Elektrokoagulation von Blasenpapillomen	7 Tage	Multiple Erosionen	123
M	596/64	31m♂	Stumpfes Bauchtrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	4
M	643/64	56 ♂	Peritonitis	3 Tage	Ulcusperforation und multiple Ulcera	4
M	407/64	18 ♂	Bauchtrauma durch Sturz	Stunden	Multiple Erosionen	123
M	824/64	34 ♂	Peritonitis durch Appendixperforation	5 Tage	Multiple Erosionen	2
M	758/63	20 ♀	Tubarruptur	3 Tage	Petechiale Blutungen	4
M	925/64	46 ♂	Kunststoffersatz der Nierenarterie wegen Stenose	11 Tage	Ulcus	4
M	238/55	51 ♂	Milzkapselriß durch Sprung vom Fuß	Stunden	Petechiale Blutungen	123
M	635/64	70 ♂	Übernähren eines perforierten Ulcus pylori	8 Tage	Ulcera	2
M	356/58	59 ♀	Peritonitis	15 Tage	Multiple Erosionen	2
M	377/58	62 ♂	Nach Laparoskopie Blutung in der Bauchhöhle	12 Tage	Multiple Erosionen	2
M	422/58	40 ♂	Laparatomie wegen perf. Ulcus duodeni	6 Tage	Multiple Erosionen	2
M	295/58	73 ♂	Prob laparatomie bei Perisplenitis	9 Tage	Multiple Erosionen	123
M	527/58	64 ♂	Stumpfes Bauchtrauma	5 Tage	Petechiale Blutungen	2
Z	1427/62	77 ♂	Operation eines Blasenkarzinoms	9 Tage	Ulcus	4
Z	1222/62	65 ♂	Sectio alta zur Hemiresektion der Blase	11 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	719/62	12 ♀	Peritonitis	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	973/63	61 ♂	Choledochotomie und Cholecystektomie	5 Tage	2 Ulcera	4
Z	155/63	8 ♂	Megaureter - Neuimplantation des Ureters in die Blase	Stunden	Multiple Ulcera	1234
Z	1905/63	64 ♂	Peritonitis	16 Tage	Multiple Erosionen	2
Z	641/60	48 ♂	Laparatomie wegen Bridenileus	8 Tage	Multiple Ulcera	13
/	2064/62	35 ♀	Paralytischer Ileus	13 Tage	Multiple Erosionen	123
/	1949/54	45 ♂	Paralytischer Ileus	3 Tage		1234
/	418/58	14 ♂	Laparatomie wegen Duodennstenose	2 Tage	Petechiale Blutungen	/

A A P im Kopf- und Brustbereich

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loc
M	305/60	21 ♂	Schädel- und stumpfes Brusttrauma d.Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	14
M	612/61	25 ♂	Schädel- und stumpfes Brusttrauma d.Unfall	Stunden	2 Erosionen	4
M	497/62	36 ♂	Schädel- und stumpfes Brusttrauma d.Sturz	Stunden	Multiple Erosionen	2
M	409/63	36 ♂	Schädelhirntrauma und Brusttrauma d.Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	1234
M	534/64	17 ♂	Schädelhirntrauma und Brusttrauma d.Unfall	3 Tage	Multiple Erosionen	123
M	620/64	50 ♂	Schädelhirntrauma und Thoraxkontusion d.Unf.	5 Tage	Ulcus	4
Z	1269/62	46 ♂	Schädelhirntrauma und Brusttrauma d.Unfall	8 Tage	Multiple Erosionen	4
Z	199/62	65 ♂	Schädelhirntrauma und Brusttrauma d.Unfall	11 Tage	Ulcus	4
Z	189/64	55 ♂	Schädelhirn- und Brusttrauma durch Unfall	5 Tage	Petechiale Blutungen	123
Z	1866/64	77 ♂	Schädelhirn- und Brusttrauma durch Unfall	3 Tage	Multiple Erosionen	4
<u>A A P im Kopf- und Bauchbereich</u>						
M	21/64	36 ♂	Schädel- und Bauchtrauma d.Unfall	16 Tage	Ulcusperforation	4
Z	1947/64	49 ♂	Schädel- und stumpfes Bauchtrauma d.Unfall	12 Tage	Multiple Erosionen	123
M	484/64	27 ♂	Schädelhirn- und Bauchtrauma durch Unfall	19 Tage	Multiple Erosionen	123

A A P im Brust- und Bauchbereich

Ort	Sektionsnummer	Alter	A A P	Intervall	Befund	Loci
M	57/61	3 ♂	Laparatomie wegen Appendizitis - anschl. Thoracotomie	2 Tage	Petechiale Blutungen	123
M	424/62	20 ♂	Brust- und Bauchtrauma durch Unfall	5 Tage	Petechiale Blutungen	1
M	493/62	59 ♂	Thoraco- abdominale Operation wegen Ösophaguscarcinom	2 Tage	Multiple Erosionen	1
M	12/63	29 ♂	Brust- und Bauchtrauma durch Unfall	Stunden	Multiple Erosionen	1
M	177/63	21 ♂	Stumpfes Brust- und Bauchtrauma d.Unfall	Stunden	Petechiale Blutungen	123
M	491/63	16 ♀	Brust- und Bauchtrauma durch Unfall	2 Tage	Petechiale Blutungen	1234
Z	922/62	39 ♂	Stumpfes Brust- und Bauchtrauma d.Unfall	7 Tage	Multiple Erosionen	123
Z	586/64	43 ♂	Brust- und Bauchtrauma durch Sturz	6 Tage	Multiple Erosionen	1
Z	321/58	47 ♂	Brust- und Bauchtrauma durch Unfall	2 Tage	Multiple Erosionen	3
<u>MDL nach Verbrennung</u>						
M	296/60	3 1/2 ♂	Verbrennung 2. und 3. Grades	28 Tage	Ulcusperforation	2
M	281/62	67 ♂	Verbrennung 2. und 3. Grades	9 Tage	Petechiale Blutungen	3
Z	726/63	53 ♂	Verbrennung 2. und 3. Grades	32 Tage	1 Erosion m.Gefäßarrosion	3
Z	479/64	37 ♂	Verbrennung 1. und 2. Grades, bs. Kopf	5 Tage	Ulcera	3
Z	361/62	56 ♀	Verbrennung 2. und 3. Grades	51 Tage	Ulcusperforation	3
Z	1422/63	47 ♂	Verbrennungen 2. und 3. Grades - Hirnödeme	6 Tage	Ulcera	1

I.

Mathematisch-statistische Methodik

Die Häufigkeit der einzelnen Blutungen wurde in verschiedenen Gruppierungen der Fälle, zum Beispiel nach dem Alter, dem Geschlecht, der Lokalisation des auslösenden Prozesses usw. ermittelt. Es wurde geprüft, ob die Häufigkeitsunterschiede zwischen den Klassen jeder Gruppierung, beispielsweise zwischen den Altersklassen, nicht nur zufällig sind. Angewandt wurde dazu das χ^2 -Verfahren, bei dem man allerdings nicht von den Häufigkeiten (Prozentwerten) selbst, sondern von den absoluten Zahlen ausgeht. Um festzustellen, ob zum Beispiel in einer Gruppe (bei Fällen mit auslösendem Prozeß im Kopfbereich im Alter unter 51 Jahren) die Blutungen (B) wesentlich häufiger bei Frauen als bei Männern vorhanden sind, trugen wir die Fallzahl in eine Vierfeldertafel mit dem Merkmal "Geschlecht" als Kopf und dem Merkmal "B" als Vorspalte ein.

	Geschlecht		Summe
	Männer	Frauen	
vorhanden	n = 18 11	n = 11 12	n = 29 1.
nicht vorhanden	n = 48 21	n = 21 22	n = 69 2.
Summe	n = 66 .1	n = 32 .2	n = 98

n_{ij} = Fallzahl im Feld der i-ten Zeile und der j-ten Spalte

$n_{i.}$ = Zeilensumme der i-ten Zeile (z.B. 29 von Zeile 1)

$n_{.j}$ = Spaltensumme der j-ten Spalte (z.B. 66 der 1. Spalte)

n = alle Fälle der Tabelle

Aus den Randeummen wurde für jedes Tabellenfach ein Erwartungswert errechnet nach der Formel:

$$E_{ij} = \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{n} \quad (\text{Erwartungswert im Feld der i-ten Zeile und der j-ten Spalte})$$

$$\text{z.B. } E_{11} = \frac{29 \cdot 66}{98} = 19,531 \quad (\text{Erwartungswert im Feld der 1. Zeile und der 1. Spalte})$$

Diese Erwartungswerte entsprechen der Hypothese, daß zwischen dem Merkmal "Geschlecht" und dem Merkmal "B" kein Zusammenhang besteht. Bei Zutreffen dieser sog. Nullhypothese wären die absoluten Werte (n_{ij}) nur zufällige Abweichungen von den erwarteten (E_{ij}). Sind die Abweichungen aber sehr groß, dann muß die Nullhypothese verworfen werden, weil große Abweichungen bei Zutreffen der Nullhypothese selten wären. Das Ergebnis wird dann - nach Errechnung einer Prüfgröße - als "signifikant" bezeichnet. Wir betrachten ein Resultat als "signifikant" bzw. als "statistisch gesichert", wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit (P) höchstens 1 % beträgt ($P \leq 1\%$), das heißt in höchstens 1 % wird die Nullhypothese verworfen, obwohl sie zutrifft.

Zur Prüfung der Signifikanz wurde χ^2 als Prüfgröße in bekannter Weise errechnet:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{k \cdot l \cdot (n_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

k = Zahl der Zeilen

l = Zahl der Spalten

Den Freiheitsgrad bestimmten wir aus: $f = (k-1)(l-1)$

Im Beispiel ergibt sich ein χ^2 -Wert von 0,52. Bei einem f von 1 ($f=1$) beträgt der einem $P = 1\%$ entsprechende tabulierte Wert 6,635. Das errechnete χ^2 ist kleiner als dieser Wert, liegt also im Zufallsbereich. Die Nullhypothese kann nicht verworfen werden.

Annahme oder Ablehnung der Nullhypothese sollen des besseren Verständnisses halber nochmals an Hand des (für das Verfahren selbst nicht benötigten) Häufigkeitsbegriffes interpretiert werden. Annahme der Nullhypothese im angeführten Beispiel bedeutet: Zwischen den Häufigkeiten der Fälle mit B bei Männern und Frauen läßt sich kein wesentlicher Unterschied nachweisen, Ablehnung der Nullhypothese im Beispiel besagt: Zwischen den Häufigkeiten der Fälle mit B bei Männern und Frauen darf eine wesentliche, d.h. eine nicht zufällig bedingte, Differenz angenommen werden.

In den Ergebnistabellen werden in jedem Fach in der Mitte der absolute Wert, rechts unten der Erwartungswert und links oben der Prozentwert angeführt:

$\%$	n_{ij}	E_{ij}
------	----------	----------

Das Gesamtmaterial ist aber in vielfacher Hinsicht inhomogen, z.B. in bezug auf das Alter, die Art und Lokalisation des auslösenden Prozesses usw. Im einem solchen Untersuchungsgut kann ein gesichertes χ^2 -Ergebnis evtl. auf einem sog. Heterogenitätseffekt beruhen, d.h. der hohe χ^2 -Wert ist nicht darauf zurückzuführen, daß wirkliche "Affinitäten" zwischen den untersuchten Merkmalen bestehen, sondern darauf, daß das Material aus Untergruppen verschiedener Größe zusammengesetzt ist, wobei innerhalb der einzelnen Untergruppen keine gesicherten Beziehungen zwischen den Merkmalen vorhanden zu sein brauchen. Ein Beispiel mit fingierten Werten soll diesen Sachverhalt erläutern: es wurde aus der Arbeit von Vogel, Hempel und Lange (1965) entnommen. Angenommen, man fände für die Kombination der Merkmale C und B in zwei Altersklassen A_1 und A_2 untenstehende Zahlen: In jeder Altersklasse besteht völlige Proportionalität, also kein statistischer Zusammenhang zwischen B und C. Die im jeweiligen Tabellenfach untenstehenden Randsummen errechneten Erwartungswerte stimmen mit den (fingierten) beobachteten Werten vollkommen überein. Es ist kein Grund vorhanden, die Nullhypothese zu verwerfen.

Faßt man nun die Tabellen der A_1 und A_2 zu einer Tabelle aller Fälle zusammen, dann ergibt sich folgendes (s. Tab. A_1 und A_2):

Altersklasse A_1						Altersklasse A_2					
		Merkmal C		Insgesamt				Merkmal C		Insgesamt	
		+	β					+	β		
Merkmal B	+	Bw	50	150	200	Merkmal B	+	Bw	10	90	100
		EW	50,0	150,0	200,0			EW	10,0	90,0	100,0
	β	Bw	10	30	240		β	Bw	50	450	500
		EW	10,0	30,0	240,0			EW	50,0	450,0	500,0
Insgesamt	Bw	60	180	240	Insgesamt	Bw	60	540	600		600,0
	EW	60,0	180,0	240,0		EW	60,0	540,0	600,0		

Tabelle A₁ und A₂

			Merkmal C		Insgesamt
			+	Ø	
Merkmal B	+	Bw Ew	60 42,9	240 257,1	300 300,0
	Ø	Bw Ew	60 77,1	480 462,9	540 540,0
Insgesamt		Bw Ew	120 120,0	720 720,0	840 840,0

Hier erkennt man auffällige Abweichungen zwischen den (fingierten) beobachteten Werten und den aus den Randsummen ermittelten Erwartungswerten ($\chi^2 = 12,3$; bei einem Freiheitsgrad = 1; $P < 1 \%$). Auf Grund dieser Ergebnisse könnte man bei Nichtberücksichtigung der Inhomogenität gesicherte Beziehungen zwischen C und B annehmen (60 Fälle mit C+B+ gegenüber rund 43 erwarteten). In Wirklichkeit ist dieser Zusammenhang durch die Materialinhomogenität vorgetäuscht. Addiert man die Erwartungswerte der Untergruppen (nach dem Alter standardisierte Erwartungswerte) und setzt die so erhaltenen Werte in die Tabelle aller Fälle ein, dann stimmen (fingiert) beobachtete Werte und erwartete Werte wieder völlig überein. Durch die Standardisierung wurde der Inhomogenitätseffekt gewissermaßen entlarvt. Umgekehrt darf man annehmen, wenn ein in der Gesamttabelle ermitteltes χ^2 auch bei Standardisierung der Erwartungswerte, z.B. nach dem Alter, gesichert bleibt, daß die Inhomogenität in bezug auf das Alter die Größe von χ^2 nicht entscheidend mitbedingt. In dieser Arbeit wurde nach Alter und Diagnosen standardisiert.

Im Rahmen der zeitlichen Auswertungen wurden zum Teil Erwartungswerte auf Grund einer Gleichverteilungshypothese berechnet, z.B. Petechien wurden bei 204 Sezierten im Abstand von 1 bis 11 Tagen nach dem zeitlich definierten Ereignis beobachtet. Nach der Hypothese der Gleichverteilung müßten etwa im Durchschnitt auf jeden Beobachtungstag $204/11 = 18,5$ Fälle entfallen. Diese 18,5 Fälle sind die Erwartungswerte bei Gültigkeit der Gleichverteilung. Die Übereinstimmung zwischen beobachteten und erwarteten Werten kann wieder mittels des χ^2 -Verfahrens vorgenommen werden (Freiheitsgrad: Zahl der Tage - 1).

E. E r g e b n i s s e.

== =====

Aus Gründen der statistischen Prüfbarkeit haben wir die Auswertung des Materials in zwei großen Gruppen vorgenommen:

I. Akute Prozesse mit Schleimhautläsion

(Blutung, Erosion, Ulcus).

II. Akute Prozesse mit und ohne Schleimhautläsion.

Die erste Gruppe diente zur Bestimmung des zeitlichen Zusammenhangs zwischen AAP einerseits und Blutungen, Erosionen und Ulcera andererseits. Weiterhin wurde an Hand dieses Materials die bevorzugte Lokalisation der einzelnen MDL untersucht.

Die zweite Gruppe diente zur Klärung des Kausalen Zusammenhangs zwischen AAP und MDL.

Gruppe I.

A. Prüfung des zeitlichen Zusammenhanges - AAP und Tod.

Es wurden zwei Fragen geprüft:

- a) Ist die Verteilung der Zeitabstände zwischen auslösendem Ereignis und Eintritt des Todes bei den verschiedenen Typen der Schleimhautläsionen einer hypothetischen Gleichverteilung entsprechend?
- b) Unterscheiden sich die Verteilungen der genannten Zeitabstände bei den drei Hauptgruppen von Schleimhautveränderungen wesentlich voneinander?

Zu a)

Die Tabellen 4, 5 und 6 geben die Verteilungen der Fälle in Abhängigkeit von der Zeit zwischen auslösendem Ereignis und Tod getrennt für Petechien, Erosionen und Ulcera wieder. In der zweiten Zeile ist jeweils der unter der Hypothese der Gleichverteilung zu erwartende Fallzahlwert angegeben. Zum Beispiel erwartet man für die Petechien im Falle der Gleichverteilung pro Tag etwa 10 Fälle (10,2). Die Hypothese der Gleichverteilung gilt für keine der drei Läsionen. Man ersieht aus den Tabellen, daß sich für Petechien die Todesfälle vor allem in den ersten Tagen, bei den Ulcera etwa zwischen 5 und 9 Tagen häufen. Bei den Erosionen besteht ebenfalls eine Tendenz zur ersten Zeitperiode (etwa bis zum 7. Tag).

Zu b)

Nachdem festgestellt wurde, daß innerhalb der einzelnen Läsionsgruppen keine Gleichverteilung der Zeitabstände vorliegt, wurde sowohl für die Fälle unter 51 Jahren, als auch bei 51 Jahren und darüber (Tabelle 7 und 8) untersucht, ob sich die drei Gruppen untereinander hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter Zeitwerte unterscheiden. Die Ergebnisse sind in beiden Gruppen signifikant. Zur Ausschaltung von Heterogenitätseffekten wurde zusätzlich für das Gesamtmaterial eine nach Alter und Diagnosen standardisierte Erwartungsberechnung vorgenommen, bei der die Zeitabstände in drei Klassen zusammengefaßt wurden (Tabelle 9, Ausgangsmaterial im Anhang). Auch nach Standardisierung lassen sich die erwähnten Differenzen statistisch sichern. Eine zusätzliche Standardisierung nach dem Geschlecht ergibt sogar erhöhte χ^2 - Werte, das heißt, in den geschlechtshomogenen Gruppen sind die beschriebenen Resultate noch deutlicher zu erkennen (Tabellen im Anhang).

Die unter a) genannten Prüfungen wurden für alle Fälle mit dem Eintritt des Todes bis zu 20 Tagen nach dem auslösenden Ereignis berechnet, die unter b) genannten Untersuchungen jedoch nur für die Fälle mit einem Zeitraum bis zu 12 Tagen. Dieses Vorgehen war notwendig, weil bei den unter b) vorgenommenen Erwartungsberechnungen die Erwartungswerte in den Feldern von 12 bis 20 Tagen meist kleiner als 1 waren. Bei einer Zusammenfassung der Klassen von 12 bis 20 Tagen wäre ein größerer Informationsverlust entstanden als dies bei einer Begrenzung bis zum 12. Tag der Fall war.

Abbildung 13 veranschaulicht die in den Tabellen 4 - 9 dargestellten Ergebnisse.

Tabelle 7

Verteilung der Fälle mit Patechien, Erosionen und Ulzera im Alter unter 51 Jahren auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	Patechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	29 22 17,297	19 10 11,834	6 1 3,869	33 33,000
1/2	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	16 12 7,862	6 3 5,379	0 0 1,759	15 15,000
2	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	22 17 13,103	12 6 8,966	12 2 2,931	25 25,000
3	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	17 13 9,434	6 3 6,455	12 2 2,110	18 18,000
4	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	3 2 4,193	11 6 2,869	0 0 0,938	8 8,000
5-8	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	13 10 18,345	33 17 12,552	47 8 4,103	35 35,000
9-12	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	0 0 5,766	13 7 3,945	23 4 1,290	11 11,000
Insgesamt	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	100 76 76,000	100 52 52,000	100 17 17,000	145 145,000

$$\chi^2 = 42,718 \quad p \leq 1\% \quad f = 12$$

Tabelle B
Verteilung der Fälle mit Petechien, Erosionen und Ulzera im Alter von 51 Jahren und darüber
auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	27 35 24,455	12 12 18,533	0 0 4,012	47 47 47,000
1/2	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	24 30 20,813	10 10 15,772	0 0 3,415	40 40 40,000
2	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	22 28 26,016	20 19 19,715	14 3 4,268	50 50 49,999
3	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	8 10 13,528	14 13 10,252	14 3 2,220	26 26 26,000
4	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	5 7 10,407	11 11 7,886	10 2 1,707	20 20 20,000
5-8	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	9 11 26,016	29 28 19,715	52 11 4,268	50 50 49,999
9-12	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	5 7 6,764	4 4 5,126	10 2 1,110	13 13 13,000
Insgesamt	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	100 128 127,999	100 97 96,999	100 21 21,000	246 246 246,000
$\chi^2 = 49,060 \quad p \leq 1\% \quad f = 12$					

Tabelle 9

Verteilung der Fälle mit Patechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	Patechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2-2	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	70 143	40 74,797	16 6	209 208,998
3-6	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	24 50	42 63	53 20	133 133,001
7-12	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	6 11	18 26	31 12	49 50,001
Insgesamt	χ $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	100 204	100 149	100 38	391 392,000
$\chi^2 = 36,431 \quad P \leq 1\% \quad f = 4$					

*) standardisiert nach Alter und Diagnosen

B. Verteilung der verschiedenen MDL im Magen-Duodenalbereich.

Zur Kennzeichnung des Sitzes verwandten wir folgende Zahlennotationen:

- 1 = Kardial
- 2 = Corpus
- 3 = Pylorus
- 4 = Duodenum.

Kombinationen dieser Ziffern bedeuten, daß an den genannten Stellen gleichzeitig Schleimhautläsionen vorhanden waren. Wenn gleichzeitig Petechien, Erosionen und Ulcera vorlagen, wurde der Fall unter der für die schwerere Läsion maßgeblichen Lokalisation ziffernmäßig erfaßt.

Die Tabellen 10 und 11 zeigen die Verteilung der Schleimhautläsion auf die verschiedenen Lokalisationen getrennt für die Fälle unter 51 und ab 51 Jahren und darüber. Statistisch gesichert ergibt sich eine verschiedene Verteilung von Petechien, Erosionen und Ulcera. Das gleiche Resultat erhält man, wenn man die Berechnung im Gesamtmaterial mit nach dem Geschlecht standardisierten Erwartungswerten vornimmt (Tabellen im Anhang).

Abbildung¹⁴ gibt die Ergebnisse von Tabelle 10 und 11 zeichnerisch wieder.

Gruppe II.

Diese Prüfung wurde mit den 1098 Sektionen des Jahres 1961 aus Zürich vorgenommen. Es handelt sich sowohl um Fälle mit als auch ohne Schleimhautläsionen. Zunächst wurde das Material ganz grob nach dem Sitz des AAP unterteilt in drei Gruppen: Kopf, Brust und Bauch.

Tabelle 10

Verteilung der Fälle unter 51 Jahren mit Patechien, Erosionen und Ulzera auf den Sitz der Schleimhautläsionen im Magendarmbereich

	$\% \frac{n_{ij}}{E_{i.}}$	1 *)	2	3	4	123	1234	$\begin{matrix} 12 \\ 13 \\ 14 \end{matrix}$	Inge- samt
Patechien	$\% \frac{n_{ij}}{E_{i.}}$	$\begin{matrix} 7 \\ 6 \end{matrix}$ 7,238	$\begin{matrix} 5 \\ 4 \end{matrix}$ 6,756	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix}$ 3,860	$\begin{matrix} 16 \\ 13 \end{matrix}$ 18,820	$\begin{matrix} 47 \\ 39 \end{matrix}$ 31,849	$\begin{matrix} 18 \\ 15 \end{matrix}$ 9,651	$\begin{matrix} 7 \\ 6 \end{matrix}$ 4,826	$\begin{matrix} 100 \\ 83 \end{matrix}$ 83,000
Erosionen	$\% \frac{n_{ij}}{E_{i.}}$	$\begin{matrix} 11 \\ 7 \end{matrix}$ 5,756	$\begin{matrix} 11 \\ 7 \end{matrix}$ 5,372	$\begin{matrix} 9 \\ 6 \end{matrix}$ 3,070	$\begin{matrix} 18 \\ 12 \end{matrix}$ 14,965	$\begin{matrix} 41 \\ 27 \end{matrix}$ 25,326	$\begin{matrix} 6 \\ 4 \end{matrix}$ 7,674	$\begin{matrix} 4 \\ 3 \end{matrix}$ 3,837	$\begin{matrix} 100 \\ 66 \end{matrix}$ 66,000
Ulzere	$\% \frac{n_{ij}}{E_{i.}}$	$\begin{matrix} 9 \\ 2 \end{matrix}$ 2,006	$\begin{matrix} 13 \\ 3 \end{matrix}$ 1,872	$\begin{matrix} 9 \\ 2 \end{matrix}$ 1,070	$\begin{matrix} 61 \\ 14 \end{matrix}$ 5,215	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix}$ 8,826	$\begin{matrix} 4 \\ 1 \end{matrix}$ 2,674	$\begin{matrix} 4 \\ 1 \end{matrix}$ 1,337	$\begin{matrix} 100 \\ 23 \end{matrix}$ 23,000
Insgesamt	$\% \frac{n_{ij}}{E_{i.}}$	$\begin{matrix} 15 \\ 15,000 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 14 \\ 14,000 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 8 \\ 8,000 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 39 \\ 39,000 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 66 \\ 66,001 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 20 \\ 19,999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 10 \\ 10,000 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 172 \\ 172,000 \end{matrix}$
$\chi^2 = 44,295 \quad p \leq 1 \% \quad r = 12$									

*) 1 = Cardia 3 = pylorus $\begin{matrix} 12 \\ 13 \end{matrix}$ } Kombinationen der Hauptlokalisationen
 2 = Corpus 4 = Duodenum $\begin{matrix} 24 \\ 34 \end{matrix}$ }

Folgende Vorfragen wurden zunächst geprüft:

- 1.) Läßt sich innerhalb der erwähnten Hauptgruppen ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem Auftreten von Schleimhautläsionen nachweisen?

Diese Prüfung wurde unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Alters, also unter 51 und ab 51 Jahren und darüber, vorgenommen. Beziehungen zwischen diesen beiden Prüfmerkmalen konnten nicht gefunden werden.

- 2.) Lassen sich innerhalb der Hauptgruppen Kopf, Brust und Bauch Zusammenhänge zwischen dem Alter und dem Merkmal Schleimhautläsion statistisch sichern?

Lediglich in der sogenannten Bauchgruppe konnte ein Zusammenhang gefunden werden. Wenn man allerdings in der Gesamtgruppe, das heißt ohne Berücksichtigung des auslösenden Prozesses, diese Beziehung mit nach den Prozessen standardisierten Erwartungswerten untersucht, ist ein Zusammenhang zwischen Alter und Schleimhautläsion zu verneinen.

- 3.) Diese groben Gruppen Kopf, Brust und Bauch wurden nun genauer aufgeteilt um festzustellen, ob sie in sich hinsichtlich der Diagnosen homogen sind.

Die Kopfgruppe wurde in folgende Teilgruppen zerlegt: Apoplexie, Encephalomalacie, FetteMBOLIE - Tumoren - Traumen - Meningitis, Encephalitis, akutes Hirnödem, Operationen. Zwischen diesen Gruppen bestanden keine wesentlichen Unterschiede in der Blutungsgefährlichkeit.

Die Brustgruppe bestand aus Fällen mit folgenden diagnostischen Einheiten: Lungenembolie - Tumoren - Pleuritis, Pleuracarcinose Hydrothorax - Thoracotomie - Traumen - Herzinfarkte. Innerhalb dieser Untergruppen konnten für die Fälle ab 51 Jahren und darüber wesentliche Unterschiede in der Häufigkeit der Schleimhautläsionen gesichert werden.

Die Bauchgruppe wurde folgendermaßen unterteilt: Peritonitis, Ascites, Ileus, Mesenterialarterienembolie - Traumen - Operationen - Tumoren, Peritonealcarcinose. Hier wieder bestanden statistisch auffällige Unterschiede bei den Todesfällen unter 51 Jahren.

Die weitere Auswertung wurde daher stets in einer genaueren diagnostischen Aufgliederung durchgeführt, sie umfaßte folgende Kategorien:

a) Kopf

b) Lungenembolie

c) Brustrest

(der die übrigen oben aufgezählten Untergruppen der Brustgruppe enthält)

d) Bauchtumoren und Peritonealcarcinosen

e) Bauchrest

(der die übrigen bereits aufgezählten Untereinheiten der Bauchgruppe enthält).

4.) Beziehung akuter auslösender Prozess - MDL.

Die Hauptfrage dieses Auswertungsabschnittes wurde mit diesen 5 Teilgruppen bearbeitet und lautete: Unterscheiden sich die Häufigkeiten von Schleimhautläsionen in den 5 Gruppen wesentlich?

Tabelle 12 zeigt, daß dies klar der Fall war.

Führt man diese Berechnung jedoch getrennt für die Fälle unter 51 Jahren und ab 51 und darüber durch, dann bestätigt sich dieses Resultat nur bei den älteren Obduktionsfällen (Tabelle im Anhang). Als nächstes prüften wir die gleiche Frage, teilten dabei aber zusätzlich das Merkmal Schleimhautläsion in die 3 Klassen Petechien, Erosionen und Ulcera auf (siehe Tabelle 13). Auch hier waren die einzelnen Gruppen statistisch gesichert unterschiedlich betroffen.

Nahm man die Berechnung mit nach dem Alter standardisierten Erwartungswerten vor, ergab sich der gleiche Unterschied (siehe Anhang).

Eine Betrachtung von Tabelle 13 über tatsächliche und erwartete Werte zeigte, daß die Petechien bei Prozessen im Bereich des Kopfes häufiger als erwartet auftraten, in den übrigen Gruppen sich jedoch umgekehrt verhielten. Bei den Erosionen waren die tatsächlichen Werte im Kopfbereich, beim Brustrest und beim Bauchrest ebenfalls höher als die Erwartungswerte, in den beiden übrigen Gruppen niedriger.

Tabella 12

Verteilung von Fällen mit und ohne Schielhautläsionen auf die Lokalisationen des ausgleichenden Prozesses

	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	Kopf	Lungen- embolie	Brusttrest	Bauchtumoren peritoneal- carcinome	Bauchtrest	Insgesamt
MDL +	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	43 93	11 23	24 51	4 8	18 38	100 213
MDL -	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	29 259	27 240	24 211	8 70	12 105	100 885
Insgesamt	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	352 352,000	263 263,000	262 262,000	78 78,000	143 143,000	1 098 1 098,000

Tabelle 13

Verteilung von Schleimhautläsionen aufgegliedert nach Petechien, Erosionen und Ulzera auf die Lokalisationen des auslösenden Prozesses

	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	Kopf	Brustrest	Lungen- embolie	Bauchtumoren peritoneal- carcinose	Bauchrest	Insgesamt
Petechien	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	16 55	9 24	5 13	5 4	8 11	107
	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	34,302	25,532	25,629	7,601	13,935	106,999
Erosionen	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	9 32	10 27	3 9	5 4	18 26	98
	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	31,417	23,384	23,474	6,962	12,763	98,000
Ulzera	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	2 6	0 1,909	1 1,916	0 0,568	1 1,042	8 8,000
$\bar{\sigma}$	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	73 259	81 211	91 240	90 70	73 105	885
	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	283,716	211,175	211,981	62,869	115,260	885,001
Insgesamt	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	100 352	100 262	100 263	100 78	100 143	1 098
	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	352,000	262,000	263,000	78,000	143,000	1 098,000
$\chi^2 = 71,514 \quad P = 1 \% \quad f = 12$							

Für die Ulcera lagen die tatsächlichen Werte im Kopfbereich bedeutend höher als die erwarteten, bei den restlichen Gruppen stimmten tatsächliche und erwartete Werte beinahe überein.

Vergleich: MSL bei akuten auslösenden Prozessen und bei
Kontrollfällen.

Bei sämtlichen bisher angeführten Gruppen lagen Prozesse vor, von denen wir annahmen, daß sie bevorzugt Schleimhautläsionen hervorrufen können. Es fehlte eine geeignete Vergleichsgruppe von Fällen desselben Alters und Geschlechts ohne derartige Prozesse. Mangels dieses geeigneten Vergleichskollektivs wurden Fälle mit Coma uræmicum herangezogen. Falls der Vergleich zwischen den Gruppen Kopf, Lungenembolie, Brustrest, Bauchtumoren und Peritonealcarcinose und Bauchrest und der Urämiegruppe keinen Unterschied ergibt, könnte dies für eine vermehrte Blutungsneigung der Urämiker sprechen. Findet man jedoch bei den Fällen mit akutem auslösendem Prozess Schleimhautblutungen häufiger als bei den vergleichbaren Urämiefällen, so darf auf eine Häufung von Schleimhautveränderungen bei diesen Fällen geschlossen werden. Wir verglichen sämtliche Gruppen getrennt nach dem Alter mit dem entsprechenden Urämiekollektiv. Die Tabellen 14 - 16 geben die Ergebnisse für die Gruppen Kopf, Brustrest und Bauchrest wieder, die übrigen Tabellen sind im Anhang.

Man fand gesicherte Unterschiede bei der Kopfgruppe ab 51 Jahren und darüber, beim Brustrest des gleichen Alters und beim Bauchrest ebenfalls des gleichen Alters. Bei der Bauchrestgruppe unter 51 Jahren war der Unterschied statistisch auffällig.

Tabelle 14

Häufigkeit der Schleimhautläsionen bei Fällen mit Lokalisation des auslösenden Prozesses und bei Fällen mit Coma uraemicum

	χ^2 $\frac{n_{ij}}{\sum_{ij}}$	unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber		
		Kopf	Coma uraemicum	Insgesamt	Kopf	Coma uraemicum	Insgesamt
MDL +	χ^2 $\frac{n_{ij}}{\sum_{ij}}$	97 29 26,250	3 1 3,750	100 30 30,000	98 64 50,957	2 1 14,043	100 65 65,000
MDL -	χ^2 $\frac{n_{ij}}{\sum_{ij}}$	84 69 71,750	16 13 10,250	100 82 82,000	73 190 203,043	27 69 55,957	100 259 259,000
Insgesamt	$\frac{n_{.j}}{\sum_{.j}}$	98 98,000	14 14,000	112 112,000	254 254,000	70 70,000	324 324,000
		$\chi^2 = 3,148$		5 % < p	$\chi^2 = 19,331$		p ≤ 1 % f = 1

Tabelle 15

Häufigkeit der Schleimhautläsionen bei Fällen mit Lokalisation des auslösenden Prozesses
im Brustbereich und bei Fällen mit Coma uremicum

	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber		
		Brusttrest	Coma uremicum	Insgesamt	Brusttrest	Coma uremicum	Insgesamt
MDL +	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	87 7	13 1	100 8	98 44	2 1	100 45
MDL -	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	77 43	23 13	100 56	71 168	29 69	100 237
Insgesamt	$n_{\cdot j}$ $E_{\cdot j}$	50 50,000	14 14,000	64 64,000	212 212,000	70 70,000	282 282,000
		$\chi^2 = 0,470$		5 % $\leq p$	$\chi^2 = 14,655$		$p \leq 1$ %
		$f = 1$			$f = 1$		

Tabelle 16

Häufigkeit der Schleimhautläsionen bei Fällen mit Lokalisation des auslösenden Prozesses im Bauchbereich und bei Fällen mit Coma uraemicum

	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber		
		Bauchrest	Coma uraemicum	Insgesamt	Bauchrest	Coma uraemicum	Insgesamt
MDL +	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	92 11 7,800	8 1 4,200	100 12 12,000	96 27 17,519	4 1 10,481	100 28 28,000
MDL -	χ^2 $\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	54 15 18,200	46 13 9,800	100 28 28,000	57 90 99,481	43 69 59,519	100 159 159,000
Insgesamt	$\frac{n_{..}}{E_{..}}$	26 26,000	14 14,000	40 40,000	117 117,000	47 70 70,000	167 187,000
		$\chi^2 = 5,358 \quad 1\% < P \leq 5\% \quad f = 1$			$\chi^2 = 16,121 \quad p < 1\% \quad f = 1$		

Bei Betrachtung der gesamten Tabellen stellten wir fest, daß bei den Fällen mit akutem auslösendem Prozess die Blutungsbereitschaft stets häufiger als bei den entsprechenden Kontrollfällen war.

F. B e s p r e c h u n g d e r E r g e b n i s s e .

== =====

Wir haben uns eingangs folgende Fragen gestellt:

1. Besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen bestimmten akuten pathologisch-anatomischen Prozessen einerseits und Läsionen der Magen-Darmschleimhaut andererseits?
2. Ist bei Magen-Duodenal-Schleimhautblutungen die Möglichkeit gegeben, daß sich aus ihnen Erosionen und daraus wieder Ulcera weiterentwickeln?
3. Gibt es für die einzelnen Typen der MDL bevorzugte Lokalisationen im Bereich der Magen- und Duodenalschleimhaut?

1.) Frage nach dem kausalen Zusammenhang.

Wie die statistische Auswertung des Obduktionsmaterials zeigt und wie Tabelle 13 ausführlich darstellt, ist das Zusammenreffen von akuten auslösenden Prozessen und MDL wesentlich häufiger als es den Zufallserwartungen entspricht.

Wir sind also zu der Annahme berechtigt, daß zwischen beiden Prozessen ein kausaler Zusammenhang besteht.

Besonders eindrücklich ist der Zusammenhang zwischen Schädelprozessen und MDL.

2.) Frage nach der Möglichkeit von Übergängen zwischen Blutung, Erosion und Ulcus.

Eine Auswertung der jeweiligen Zeitspanne zwischen Todeseintritt nach akuten auslösenden Prozessen und dem Grad der Schleimhautläsion zeigt eindeutig,

daß der Schwerpunkt der petechialen Blutungen in den ersten Stunden und Tagen liegt.

Der Gipfel der Erosionen liegt etwa um den 3. Tag.

Ulcera treten vermehrt nach dem 5. Tag auf.

Aus diesem zeitlichen Hintereinander von Blutung, Erosion und Ulcus läßt sich zwanglos der Schluß ableiten,

daß ein Teil der Blutungen zu Erosionen wird, und daß einige Erosionen in Ulcera übergehen können.

Es bleibt selbstverständlich die Frage offen, inwieweit aus einem solchen akut entstandenen Ulcus wiederum ein klinisch und anatomisch definiertes Ulcus callosum werden kann.

3.) Frage nach einer bevorzugten Lokalisation der einzelnen Läsionstypen.

Hier zeigt sich,

daß die Petechien ebenso wenig wie die Erosionen die Kardia-, den Corpus- oder Pylorusbereich der Magenschleimhaut bevorzugen. Eindeutig jedoch finden sich häufiger petechiale Blutungen und Erosionen in der Magenschleimhaut als in der Schleimhaut des Duodenums. Umgekehrt dagegen verhalten sich die Ulcera. Diese bevorzugen im starken Maße den Duodenalbereich.

Es muß dabei offen bleiben, ob Blutungen und Erosionen in der Magenschleimhaut die größere Chance zur Abheilung besitzen,

während sie im Duodenalbereich exulcerieren.

Wir müssen uns abschließend die Frage stellen, welcher Mechanismus für die Magen-Darm-Schleimhautläsionen letzten Endes verantwortlich ist, für Veränderungen also, bei denen es sich nicht lediglich um pathologisch-anatomische Befunde handelt, sondern um Prozesse, die im Einzelfall für den Patienten tödlich sein können. Wir gehen zum Ausgangspunkt zurück und prüfen, was die oben definierten sogenannten akuten auslösenden Prozesse miteinander gemeinsam haben. Es fällt dabei auf, daß sämtliche dieser Prozesse in Kopf-, Brust- und Bauchbereich zu einem mehr oder weniger lange dauernden Kollaps des Patienten geführt haben.

Wir können deshalb vereinfachend feststellen, daß Blutungen, Erosionen und akute Ulcera im Magen- und Duodenalschleimhautbereich Kollapsfolgen sind.

G. Zusammenfassung.

== =====

Ein Überblick über die einschlägige Literatur zeigt zahlreiche, vorwiegend kasuistische Beobachtungen, welche für einen kausalen Zusammenhang zwischen akuten Prozessen verschiedenster Art und Magen-Duodenalschleimhautläsionen (MDL) sprechen. Diese können unter Umständen Anlaß zu tödlichen Blutungen geben.

Zur Klärung der Zusammenhänge zwischen Schleimhautläsionen einerseits und akuten auslösenden Prozessen (AAP) in Kopf-, Brust- und Bauchbereich andererseits wurden von uns 2598 Obduktionen mit Hilfe statistischer Methodik ausgewertet.

Wir kamen dabei zu folgenden Ergebnissen:

1. Das Zusammentreffen der MDL mit akut auslösenden Prozessen in Kopf-, Brust- und Bauchbereich ist eindeutig häufiger als es den Zufallserwartungen entspricht.
2. Abhängig von der Überlebenszeit werden die drei MDL-Typen (Hämorrhagie, Erosion, Ulcus) in unterschiedlicher Häufigkeit angetroffen:
so liegt die Häufung der Hämorrhagien in den ersten Stunden bis zum 2. Tag.
Erosionen haben einen Häufigkeitsgipfel um den 3. Tag, und Ulcera werden vorwiegend nach dem 5. Tag angetroffen.
Daraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeit einer Weiterentwicklung von Hämorrhagien über Erosionen zu Ulcera.
3. Hämorrhagien finden sich vorwiegend in der Magen-, aber auch in der Duodenalschleimhaut.
4. Erosionen liegen im allgemeinen in der Magenschleimhaut, ohne erkennbare Bevorzugung bestimmter Schleimhautbezirke.
5. Akute Ulcera finden sich überwiegend in der Duodenalschleimhaut.
6. Als gemeinsamer pathogenetischer Mechanismus der von uns untersuchten AAP wird der Kollaps angesehen.
Bei den Hämorrhagien, Erosionen und akuten Ulcera im Magen-Duodenalbereich handelt es sich somit um pathologisch-anatomische Kollapsfolgen.

H. A n h a n g .

== =====

Tabelle 1

Übersicht über die Verteilung der Fällen mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf die zeitlichen Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen	unter 51 Jahre				51 Jahre und darüber			
	Petechien	Erosionen	Ulcera	Insgesamt	Petechien	Erosionen	Ulcera	Insgesamt
1/2	22	10	1	33	35	12	0	47
1/2	12	3	0	15	30	10	0	40
2	17	6	2	25	28	19	3	50
3	13	3	2	18	10	13	3	26
4	2	6	0	8	7	11	2	20
5	8	7	3	18	7	12	6	25
6	0	4	2	6	2	7	2	11
7	2	4	2	8	1	6	1	8
8	0	2	1	3	1	3	2	6
9	0	1	1	2	3	2	1	6
10	0	3	2	5	2	0	0	2
11	0	1	1	2	2	1	1	4
12	0	2	0	2	0	1	0	1
Insgesamt	76	52	17	145	128	97	21	246

Tabelle 2

Verteilung der Todesfälle durch Unfälle mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des ausbleibenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen		unter 51 Jahre				51 Jahre und darüber			
		Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt	Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2 - 2	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	20 16,085	7 10,128	1 1,787	28 28,000	15 12,000	5 5,714	0 2,286	20 20,000
3 - 6	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	6 7,468	6 4,702	1 0,830	13 13,000	4 6,600	4 3,143	3 1,257	11 11,000
7 - 12	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	1 3,447	4 2,170	1 0,383	6 6,000	2 2,400	1 1,143	1 0,457	4 4,000
Insgesamt	$\frac{n_{.j}}{E_{.j}}$	27 27,000	17 17,000	3 3,000	47 47,000	21 21,000	10 10,000	4 4,000	35 35,000

Tabelle 3

Verteilung der Todesfälle durch Operationen mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf
zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen		unter 51 Jahre				51 Jahre und darüber			
		Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt	Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2 - 2	$\frac{n}{E} \cdot \frac{1}{2}$	10 7,116	7 7,953	1 2,930	18 17,999	6 4,550	7 6,825	0 1,625	13 13,000
3 - 6	$\frac{n}{E} \cdot \frac{1}{3}$	7 6,326	7 7,070	2 2,605	16 16,001	6 5,600	8 8,400	2 2,000	16 16,000
7-- 12	$\frac{n}{E} \cdot \frac{1}{7}$	0 3,558	5 3,977	4 1,465	9 9,000	2 3,850	6 5,775	3 1,375	11 11,000
Insgesamt	$\frac{n}{E} \cdot \frac{1}{J}$	17 17,000	19 19,000	7 7,000	43 43,000	14 14,000	21 21,000	5 5,000	40 40,000

Tabelle 4

Verteilung der Todesfälle durch Apoplexien und Encephalomalacien mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen		unter 51 Jahre				51 Jahre und darüber			
		Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt	Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2 - 2	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	4 3,857	2 1,714	0 0,429	6 6,000	28 22,222	5 10,556	2 2,222	35 35,000
3 - 6	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	4 3,214	1 1,429	0 0,357	5 5,000	9 14,603	12 6,937	2 1,460	23 23,000
7 - 12	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	1 1,929	1 0,857	1 0,214	3 3,000	3 3,175	2 1,508	0 0,317	5 5,000
Insgesamt	$\frac{n_{.j}}{E_{.j}}$	9 9,000	4 4,000	1 1,000	14 14,000	40 40,000	19 19,001	4 3,999	63 63,000

Tabelle 5

Verteilung der Todesfälle durch Peritonitis mit Patechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen		unter 51 Jahre				51 Jahre und darüber			
		Patechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt	Patechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2 - 2	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	2 0,750	0 1,000	0 0,250	2 2,000	3 1,250	2 3,125	0 0,625	5 5,000
3 - 6	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	1 1,875	3 2,500	1 0,625	5 5,000	2 3,750	11 9,375	2 1,875	15 15,000
7 - 12	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	0 0,375	0 0,500	0 0,125	1 1,000	1 1,000	2 2,500	1 0,500	4 4,000
Insgesamt	$\frac{n_{\cdot j}}{E_{\cdot j}}$	3 3,000	4 4,000	1 1,000	8 8,000	6 6,000	15 15,000	3 3,000	24 24,000

Tabelle 6

Verteilung der Todesfälle durch Herzinfarkte und Lungenembolien mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen		unter 51 Jahre				51 Jahre und darüber			
		Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt	Petechien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2 - 2	$\frac{n_{1j}}{E_{1j}}$	6 6,000	0	0	6 6,000	30 26,182	15	0	45 45,001
3 - 6	$\frac{n_{1j}}{E_{1j}}$	0	0	0	0	2 5,818	5	3	10 9,999
7 - 12	$\frac{n_{1j}}{E_{1j}}$	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	$\frac{n_{..j}}{E_{..j}}$	6 6,000	0	0	6 6,000	32 32,000	20 20,000	3 3,000	55 55,000

Tabelle 7

Verteilung der restlichen Todesfälle mit Petechnien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen		unter 51 Jahre				51 Jahre und darüber			
		Petechnien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt	Petechnien	Erosionen	Ulzera	Insgesamt
1/2 - 2	$\frac{n_{1j}}{E_{1j}}$	8 6,222	3 3,556	1 2,222	12 12,000	11 9,828	7 7,862	1 1,310	19 19,000
3 - 6	$\frac{n_{1j}}{E_{1j}}$	6 6,222	3 3,556	3 2,222	12 12,000	3 3,621	3 2,897	1 0,483	7 7,001
7 - 12	$\frac{n_{1j}}{E_{1j}}$	0 1,556	2 0,889	1 0,556	3 3,001	1 1,552	2 1,241	0 0,207	3 3,000
Insgesamt	$\frac{n_{\cdot j}}{E_{\cdot j}}$	14 14,000	8 8,001	5 5,000	27 27,001	15 15,001	12 12,000	2 2,000	29 29,001

Tabelle 8

Verteilung der männlichen Todesfälle mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	Petechien	Erosionen	Ulcera	Insgesamt
		$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	
1/2 - 2	91	66,036	41	5	137
				16,755	137,000
3 - 6	34	47,719	48	17	99
				12,108	99,000
7 - 12	9	20,245	21	12	42
				5,137	42,001
Insgesamt	134	134,000	110	34	278
				34,000	278,001

Tabelle 9

Verteilung der weiblichen Todesfälle mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen	n _{ij} E _{ij}	Petechien	Erosionen	Ulcera	Insgesamt
1/2 - 2	n _{ij} E _{ij}	52 44,602	19 24,850	1 2,549	72 72,001
3 - 6	n _{ij} E _{ij}	16 21,062	15 11,735	3 1,204	34 34,001
7 - 12	n _{ij} E _{ij}	2 4,336	5 2,416	0 0,248	7 7,000
Insgesamt	n _{.j} E _{.j}	70 70,000	39 39,001	4 4,001	113 113,002

Tabelle 10

Verteilung der männlichen und weiblichen Fälle mit Patechien, Erosionen und Ulzera auf zeitliche Abstände zwischen Beginn des auslösenden Prozesses und Tod

Zeit- abstände in Tagen		Patechien	Erosionen	Ulcera	Insgesamt
	$\frac{n_{ij}}{\Sigma_{ij}}$				
1/2 - 2	143 $\frac{n_{1j}}{\Sigma_{1j}}$	110,638	60 79,059	6 19,304	209 209,001
3 - 6	50 $\frac{n_{1j}}{\Sigma_{1j}}$	68,781	63 50,908	20 13,312	133 133,001
7 - 12	11 $\frac{n_{1j}}{\Sigma_{1j}}$	24,581	26 19,035	12 5,385	49 49,001
Insgesamt	204 $\frac{n_{.j}}{\Sigma_{.j}}$	204,000	149 149,002	38 38,001	391 391,003
$\chi^2 = 52,768 \quad p = 1\% \quad f = 4$					

*) standardisiert nach dem Geschlecht

Tabelle 11

Verteilung der männlichen Todesfälle mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf
den Sitz der Schleimhautläsion im Magendarmbereich

	1*)	2	3	4	123	1234	12 13 14	Inge- samt
	n_{ij} Σ_{ij}							
Petechien	13 14,092	8 11,450	1 11,450	22 37,872	66 47,560	23 12,771	11 8,807	144 144,002
Erosionen	16 13,407	13 10,893	21 10,893	33 36,031	41 45,248	5 12,150	8 8,379	137 137,001
Ulzera	3 4,502	5 3,657	4 3,657	31 12,098	1 15,193	1 4,080	1 2,813	46 46,000
Insgesamt	32 32,001	26 26,000	26 26,000	86 86,001	108 108,001	29 29,001	20 19,999	327 327,003

*) 1 = Cardia
2 = Corpus
3 = Pylorus
4 = Duodenum
12 24
13 34
14 } Kombinationen der Haupt-
lokalisationen

Tabelle 12

Verteilung der weiblichen Todesfälle mit Petechien, Erosionen und Ulzera auf den Sitz der Schleimhautläsion im Magendarmbereich

	1*)	2	3	4	123	1234	12 13 14	24 34	Insgesamt
Petechien	$\begin{matrix} n_{ij} \\ \Sigma_{ij} \end{matrix}$ 4 3,818	0 4,354	0 2,177	12 16,871	45 37,551	15 10,884	4 4,354		80 79,999
Erosionen	$\begin{matrix} n_{ij} \\ \Sigma_{ij} \end{matrix}$ 3 2,667	7 3,048	2 1,524	12 11,810	23 26,286	5 7,619	4 3,048		56 56,002
Ulcera	$\begin{matrix} n_{ij} \\ \Sigma_{ij} \end{matrix}$ 0 0,524	1 0,599	2 0,299	7 2,320	1 5,163	0 1,497	0 0,599		11 11,001
Insgesamt	$\begin{matrix} n_{\cdot j} \\ \Sigma_{\cdot j} \end{matrix}$ 7 6,999	8 8,001	4 4,000	31 31,001	69 69,000	20 20,000	8 8,001	147 147,002	

*) 1 = Cardia
2 = Corpus

3 = Pylorus
4 = Duodenum

12 24 } Kombinationen der Haupt-
13 34 } Lokalisationen
14

Tabelle 14

Verteilung der Fälle mit auslösendem Prozeß im Kopfbereich
auf Geschlecht und Schleimhautläsion

		unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber		
		Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt
MDL +	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	18 19,531	11 9,469	29 29,000	40 36,283	24 27,717	64 64,000
MDL Ø	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	48 46,469	21 22,531	69 69,000	104 107,717	86 82,283	190 190,000
Insgesamt	$\frac{n_{.j}}{E_{.j}}$	66 66,000	32 32,000	98 98,000	144 144,000	110 110,000	254 254,000
		$\chi^2 = 0,522 \quad 5\% < P \quad f = 1$			$\chi^2 = 1,175 \quad 5\% < P \quad f = 1$		

Tabelle 15

Verteilung der Fälle mit auslösendem Prozeß im Brustbereich auf Geschlecht
und Schleimhautläsion

		unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber		
		Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt
MDL +	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	6 4,645	2 3,355	8 8,000	37 36,492	29 29,508	66 66,000
MDL Ø	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	30 31,355	24 22,645	54 54,000	219 219,508	178 177,492	397 397,000
Insgesamt	$\frac{n_{.j}}{E_{.j}}$	36 36,000	26 26,000	62 62,000	256 256,000	207 207,000	463 463,000
		$\chi^2 = 1,082 \quad 5 \text{ } \cancel{<} p \quad f = 1$			$\chi^2 = 0,018 \quad 5 \text{ } \cancel{<} p \quad f = 1$		

Tabelle 16

Verteilung der Fälle mit auslösendem Prozeß im Bauchbereich auf
Geschlecht und Schleimhautläsion

		unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber		
		Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt
MDL +	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	4 5,735	9 7,265	13 13,000	12 13,059	21 19,941	33 33,000
MDL Ø	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	11 9,265	10 11,735	21 21,000	62 60,941	92 93,059	154 154,000
Insgesamt	$\frac{n_{.j}}{E_{.j}}$	15 15,000	19 19,000	34 34,000	74 74,000	113 113,000	187 187,000
		$\chi^2 = 1,196$		5 % < P	$\chi^2 = 0,173$		5 % < P
		f = 1			f = 1		

Tabelle 17

Verteilung der Fälle mit auslösendem Prozeß im Kopfbe-
reich auf Alter und Schleimhautläsion

		unter 51 Jahre	51 Jahre und darüber	Insgesamt
MDL +	n_{ij} E_{ij}	29 25,892	64 67,108	93 93,000
MDL Ø	n_{ij} E_{ij}	69 72,108	190 186,892	259 259,000
Insgesamt	$n_{.j}$ $E_{.j}$	98 98,000	254 254,000	352 352,000
$\chi^2 = 0,702 \quad 5 \% < P \quad f = 1$				

Tabelle 18

Verteilung der Fälle mit auslösendem Prozeß im Brust-
bereich auf Alter und Schleimhautläsion

		unter 51 Jahre	51 Jahre und darüber	Insgesamt
MDL +	n_{ij} E_{ij}	8 8,739	66 65,261	74 74,000
MDL Ø	n_{ij} E_{ij}	54 53,261	397 397,739	451 451,000
Insgesamt	$n_{.j}$ $E_{.j}$	62 62,000	463 463,000	525 525,000
$\chi^2 = 0,082 \quad 5 \% < P \quad f = 1$				

Tabelle 19

Verteilung der Fälle mit auslösendem Prozeß im Bauchbereich
auf Alter und Schleimhautläsion

		unter 51 Jahre	51 Jahre und darüber	Insgesamt
MDL +	n_{ij} E_{ij}	13 7,077	33 38,923	46 46,000
MDL Ø	n_{ij} E_{ij}	21 26,923	154 148,077	175 175,000
Insgesamt	$n_{.j}$ $E_{.j}$	34 34,000	187 187,000	221 221,000
$\chi^2 = 7,398 \quad P \leq 1\% \quad f = 1$				

Tabelle 20

Verteilung der gesamten Fälle auf Alter und
Schleimhautläsionen

		unter 51 Jahre	51 Jahre und darüber	Insgesamt
MDL +	n_{ij} $E_{ij}^{*)}$	50 44,404	163 168,596	213 213,000
MDL Ø	n_{ij} E_{ij}	144 149,596	741 735,404	885 885,000
Insgesamt	$n_{.j}$ $E_{.j}$	194 194,000	904 904,000	1 098 1 098,000
$\chi^2 = 1,143 \quad 5\% < P \quad f = 1$				

*) standardisiert nach Diagnosen (auslösendem Prozeß)

Tabelle 21

Verteilung der Fälle mit auslösenden Prozessen im Kopfbereich auf die Schleimhautläsionen

		unter 51 Jahre						51 Jahre und darüber					
		Apoplexie, Encephalomalacie, Fettembolie	Tumoren	Traumen	Meningitis, Encephalitis, akutes Hirn-ödem	Kopfoperationen	Insgesamt	Apoplexie, Encephalomalacie, Fettembolie	Tumoren	Traumen	Meningitis, Encephalitis, akutes Hirn-ödem	Kopfoperationen	Insgesamt
MDL +	n_{ij}	4	2	5	9	4	29	39	4	12	5	4	64
	E_{ij}	4,143	4,439	8,878	7,102	4,439	29,001	40,315	7,055	11,339	2,520	2,772	64,001
MDL Ø	n_{ij}	10	13	25	15	6	69	121	24	33	5	7	190
	E_{ij}	9,857	10,561	21,122	16,898	10,561	68,999	199,685	20,945	33,661	7,480	8,228	189,999
Insgesamt	$n_{.j}$	14	15	30	24	15	98	160	28	45	10	11	254
	$E_{.j}$	14,000	15,000	30,000	24,000	15,000	98,000	160,000	28,000	45,000	10,000	11,000	254,000
		$\chi^2 = 11,693$ 1 % $\Delta p \leq 5$ % f = 4						$\chi^2 = 5,867$ 5 % Δp f = 4					

Tabelle 22

Verteilung der Fälle mit auslösenden Prozessen im Brustbereich auf die Schleimhautläsionen

		unter 51 Jahre						51 Jahre und darüber							
		Lungen-embolie	Tumoren	pleuri- tis, pleura- carci- nose, Hydro- thorax	Thora- cotomie	Trau- men	Herz- in- farkt	In- ge- samt	Lungen-embolie	Tumoren	pleuri- tis, pleura- carci- nose, Hydro- thorax	Thora- cotomie	Trau- men	Herz- in- farkt	In- ge- samt
MDL +	$\frac{n_{ij}}{E_{ij}}$	1 1,548	0 1,032	0 0,645	4 2,581	3 1,584	0 0,645	8 7,999	22 35,780	3 2,138	12 8,838	7 2,138	0 1,853	22 15,255	66 66,000
	$\frac{n_{i\cdot j}}{E_{i\cdot j}}$	11 10,425	8 6,968	5 4,355	16 17,419	9 10,419	5 4,355	54 54,001	229 215,220	12 12,862	50 53,162	8 12,862	13 11,147	85 91,747	397 397,000
Insgesamt	$\frac{n_{\cdot j}}{E_{\cdot j}}$	12 12,000	8 8,000	5 5,000	20 20,000	12 12,000	5 5,000	62 62,000	251 251,000	15 15,000	62 62,000	15 15,000	13 13,000	107 107,000	436 436,000
		$\chi^2 = 5,348 \quad 5\% < P \quad f = 6$						$\chi^2 = 26,450 \quad P \leq 1\% \quad f = 6$							

Tabelle 23

Verteilung der Fälle mit auslösenden Prozessen im Bauchbereich
auf die Schleimhautläsionen

		unter 51 Jahre					51 Jahre und darüber				
		Perito- nitis, Ascites ileus	Trauma	Opera- tionen	Tumoren, Peritoneal- carcinose	Inse- gesamt	Peritoni- tis, Asci- tes ileus	Trauma	Opera- tionen	Tumoren, Peritoneal- carcinose	Inse- gesamt
MDL +	n_{ij} E_{ij}	9 5,353	0 1,912	2 2,676	2 3,059	13 13,000	21 17,118	1 0,529	5 3,000	6 12,353	33 33,000
MDL Ø	n_{ij} E_{ij}	5 8,647	5 3,088	5 4,324	6 4,941	21 21,000	76 79,882	2 2,471	12 14,000	64 57,647	154 154,000
Inse- gesamt	$n_{.j}$ $E_{.j}$	14 14,000	5 5,000	7 7,000	8 8,000	34 34,000	97 97,000	3 3,000	17 17,000	70 70,000	187 187,000
		$\chi^2 = 7,989 \quad 1\% < p \leq 5\% \quad f = 3$					$\chi^2 = 7,165 \quad 5\% < p \quad f = 3$				

Tabelle 24

Verteilung von Fällen mit und ohne Schleimhautläsionen auf die
Lokalisationen des auslösenden Prozesses

		unter 51 Jahre					51 Jahre und darüber						
		Kopf	Lungen-embolie	Brust-rest	Bauch-tumor, perito-nealcar-cinose	Bauch-rest	Insgesamt	Kopf	Lungen-embolie	Brust-rest	Bauch-tumor, perito-nealcar-cinose	Bauch-rest	Insgesamt
MDL +	$\begin{matrix} n_{ij} \\ \epsilon_{ij} \end{matrix}$	29 25,258	1 3,093	7 12,887	2 2,062	11 6,701	50 50,001	64 45,799	22 45,258	44 38,226	6 12,622	27 21,096	163 163,001
	$\begin{matrix} n_{ij} \\ \epsilon_{ij} \end{matrix}$	69 72,742	11 8,907	43 37,113	6 5,938	15 19,299	144 143,999	190 208,201	229 205,742	168 173,774	64 57,378	90 95,904	741 740,999
Insgesamt	$\begin{matrix} n_{.j} \\ \epsilon_{.j} \end{matrix}$	98 98,000	12 12,000	50 50,000	8 8,000	26 26,000	194 194,000	254 254,000	251 251,000	212 212,000	70 70,000	117 117,000	904 904,000
		$\chi^2 = 9,996 \quad 1 \% < p \leq 5 \% \quad f = 4$					$\chi^2 = 30,724 \quad p \leq 1 \% \quad f = 4$						

Tabelle 25

Verteilung von Schleimhautläsionen aufgegliedert nach Patechien, Erosionen
und Ulzera auf die Lokalisationen des auslösenden Prozesses

		unter 51 Jahren						51 Jahre und darüber					
		Kopf	Brust- rest	Lungen- embolie	Bauch- tumoren, perito- nealcar- cinose	Bauch- rest	Insgesamt	Kopf	Brust- rest	Lungen- embolie	Bauch- tumoren, perito- nealcar- cinose	Bauch- rest	Insgesamt
Patech- en	$\frac{n_{ij}}{\epsilon_{ij}}$	15 12,629	3 6,443	1 1,546	1 1,031	5 3,351	25 25,000	40 23,040	21 19,230	12 12,768	3 6,350	6 10,613	82 82,001
Erosi- onen	$\frac{n_{ij}}{\epsilon_{ij}}$	11 10,608	4 5,412	0 1,299	1 0,866	5 2,814	21 20,999	21 21,635	23 18,058	9 21,379	3 5,962	21 9,966	77 77,000
Ulzera	$\frac{n_{ij}}{\epsilon_{ij}}$	3 2,021	0 1,031	0 0,247	0 0,165	1 0,536	4 4,000	3 1,124	0 0,938	1 1,111	0 0,310	0 0,518	4 4,001
$\bar{x}$	$\frac{n_{ij}}{\epsilon_{ij}}$	69 72,742	43 37,113	11 8,907	6 5,938	15 19,299	144 143,999	190 208,201	168 173,774	229 205,742	64 57,378	90 95,904	741 740,999
Insgesamt	$\frac{n_{ij}}{\epsilon_{ij}}$	98 98,000	50 49,999	12 11,999	8 8,000	26 26,000	194 193,998	254 254,000	212 212,000	251 251,000	70 70,000	117 117,001	904 904,001

Tabelle 26

Verteilung von Schleimhautläsionen aufgegliedert nach Petechien, Erosionen
und Ulzera auf die Lokalisationen des auslösenden
Prozesses

	Kopf	Brustrest	Lungen- embolie	Bauchtumoren peritoneal- carcinome	Bauchrest	Insgesamt
Petechien $\frac{n_{ij}}{\sum_{ij}} \cdot 100$	55 35,669	24 25,673	13 24,314	4 7,381	11 13,964	107 107,001
Erosionen $\frac{n_{ij}}{\sum_{ij}}$	32 32,243	27 23,470	9 22,678	4 6,828	26 12,780	98 97,999
Ulzera $\frac{n_{ij}}{\sum_{ij}}$	6 3,145	0 1,969	1 1,358	0 0,475	1 1,054	8 8,001
$\bar{p}$ $\frac{n_{ij}}{\sum_{ij}}$	259 280,943	211 210,887	240 214,646	70 63,316	105 115,208	885 884,995
Insgesamt $\frac{n_{.j}}{\sum_{.j}}$	352 352,000	262 262,999	263 262,996	78 78,000	143 143,001	1 098 1 097,996
$\chi^2 = 53,107 \quad p \leq 1\% \quad f = 12$						

*) standardisiert nach dem Alter

Tabelle 27

Häufigkeit der Schleimhautläsionen bei Fällen mit Lokalisation des auslösenden Prozesses im Brustbereich und bei Fällen mit Coma uraemicum

		unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber		
		Lungen- embolie	Coma uraemicum	Insgesamt	Lungen- embolie	Coma uraemicum	Insgesamt
MDL +	$\frac{n_{ij}}{\Sigma_{ij}}$	1 0,923	1 1,077	2 2,000	22 17,984	1 5,016	23 23,000
MDL Ø	$\frac{n_{ij}}{\Sigma_{ij}}$	11 11,077	13 12,923	24 24,000	229 233,016	69 64,984	298 298,000
Insgesamt	$\frac{n_{.j}}{\Sigma_{.j}}$	12 12,000	14 14,000	26 26,000	251 251,000	70 70,000	321 321,000
		$\chi^2 = 0,013 \quad 5\% < p \quad f = 1$			$\chi^2 = 4,429 \quad 1\% < p \leq 5\% \quad f = 1$		

Tabelle 28

Häufigkeit der Schleimhautläsionen bei Fällen mit Lokalisation des ausbleibenden
Prozesses im Bauchbereich und bei Fällen mit Coma
uraemicum

		unter 51 Jahre			51 Jahre und darüber			
		Bauchtumoren peritoneal- carcinose	Coma urae- micum	Insgesamt	Bauchtumoren peritoneal- carcinose	Coma urae- micum	Insgesamt	
MDL +	n_{ij}	2	1	3	6	1	7	
	E_{ij}	1,091	1,909	3,000	3,500	3,500	7,000	
MDL Ø	n_{ij}	6	13	19	64	69	133	
	E_{ij}	6,909	12,091	19,000	66,500	66,500	133,000	
Insgesamt	$n_{.j}$	8	14	22	70	70	140	
	$E_{.j}$	8,000	14,000	22,000	70,000	70,000	140,000	
		$\chi^2 = 1,378 \quad 5\% < P \quad f = 1$			$\chi^2 = 3,759 \quad 5\% < P \quad f = 1$			

I. L i t e r a t u r .

== =====

- Albrich, W. Ein Fall von Verblutung aus einem Aneurysma einer Magenarterie
Wien. klin. Wschr. 101; 792-793 (1951)
- Berger, Cl. Über Magenerosionen
Münch.med. Wschr. 54; 1118-1119 (1907)
- V. Bergmann, G. Das spasmogene Ulcus pepticum
Münch.med. Wschr. 60; 169-174 (1913)
- Billroth, Th. Über Duodenalgeschwür bei Septicämie
Wien. med. Wschr. 45; 705 (1867)
- Börger, G. Zur Chirurgie der schweren arteriellen Blutung aus akuten Ulcerationen der oberen Magenhälfte
Bruns Beitr. klin. Chir. 207; 134-144 (1963)
- Boles, R.S. Neurogenic factors in production of acute gastric ulcer
u. Riggs, H.E. J. Amer. Med. Ass. 115; 1771-1773 (1940)
- Büchner, F. Die Pathogenese der peptischen Veränderungen
Gustav Fischer Jena (1931)
- Burdenko, N. Zur Pathogenesis einiger Formen des runden
u. Mogilnitzky, B. Magen-Darmgeschwürs
Zschr. Neurol., Berlin 103-107; 42-62 (1926)
- Busse, O. Über Darmveränderungen nach Verbrennung
Verh. Dtsch. Path. Ges. 25; (17. Tagung)
290-294 (1914)
- Busse, W. Über postoperative Magen- und Darmblutungen
Arch. klin. Chir., Berlin 76; 122-179 (1905)
- Cornelius, H.V. Zur Histogenese der sogenannten akuten solitären Magenerosion Dieulafoy
Frankf. Zschr. Path. 63; 582-588 (1952)
- Crohn, B.B. Traumatic ulcer of the duodenum and stomach
u. Gerendasy, J. J. Amer. Med. Ass. 100;
1653-1658 (1953)

- Cruveilheir, I. Hemorrhagies, Erosions ou ulcerations
hemorrhagiques
Atlas d'anat. pathologique du corps humain
Tome 2 Livr. 31 p. 1 (1842)
- Curling, T.B. On acute Ulceration of the duodenum in
cases of burn
Med.-Chir. Transact., London 25;
261-280 (1842)
- Curling, T.B.
u. Hunter, W. Pathology of duodenitis after burns
Lancet, London 1; 81-98 (1890)
- Cushing, H. Peptic ulcers and the interbrain
Surg. Gyn. Obstetr., Chicago 55; 1-33 (1952)
- Dalla Vedova, R. Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der
Pathogenesis des Ulcus Ventriculi
Arch. Verdauungs. Krkh. 8; 255-274
u. 411-426 (1902)
- Demme, R. Hämatemesis nach oberflächlicher Ver-
brennung
Wien. med. Bl. 51; 1610 (1884)
- Deters, U. Ein perforiertes Duodenalgeschwür nach
Verbrennung
Zbl. allg. Path. 86; 147-155 (1950)
- Dieulafoy, G. Exulceratio simplex
Clin. med. Hotel-Dieu Paris 1843 (1897/98)
- Donaldsen, G.A.
u. Hamlin, E.J. Massive Hematemesis resulting from rupture
of a gastric artery aneurysm; report of
3 cases
N. England J. Med. 243; 369-373 (1950)
- Drabig, F. Über zwei tödliche Magenblutungen aus
arrodierten submucösen Magenarterien
Virchows Arch. path. Anat. 300;
487-494 (1937)
- Ebstein, W. Experimentelle Untersuchungen über das
Zustandekommen von Blutextravasaten in
der Magenschleimhaut
Arch. exper. Path. Pharmak., Leipzig
2; 183-195 (1874)

- Eck, H. Über die akute solitäre Magenerosion
Dieulafoy
Münch. med. Wschr. 104; 1291-1294 (1962)
- Edelmann, A. Zur Kenntnis des traumatischen Magen-
geschwürs
Wien.med. Wschr. 18; 786-790 (1918)
- V. Eiselsberg, A. Über Magen- und Duodenalblutungen nach
Operationen
Arch. klin. Chir., Berlin 59; 837-847(1899)
- Fassbender, H.G. Zur Ätiologie der subendokardialen Blutung
u. Wengler, G. Virchows Arch. path. Anat. 321;
138-141 (1952)
- Fenkner Wie sind Magenblutungen nach Operationen
zu erklären
Arch. klin. Chir., Berlin 174; 487-509(1933)
- Fertig Über Ulcus ventriculi traumaticum
Münch. med. Wschr. 52; 1781-1782 (1905)
- Fritzsche, R. Über tödliche primäre parenchymatöse
Magenblutungen
Berliner klin. Wschr. 56; 747-751 (1919)
- Giersberg, O. Über tödliche arterielle Blutungen aus dem
Fundusbereich des Magens
Langenbecks Arch. klin. Chir. 299;
654-664 (1962)
- Grant, F.C. Brain lesions and duodenal ulcer;
report of 2 cases
Annals of Surgery 101; 156-166 (1935)
- Gruber, G. Über das Zustandekommen des peptischen
Magen- und Duodenalgeschwürs
Dtsch. Arch. klin. Med. 110; 481-500 (1913)
- Günzburg, F. Zur Kritik des Magengeschwürs, insbesondere
des perforierenden
Arch. physiolog. Heilkunde 11; 516-527(1852)
- Gundelfinger, E. Klinische und experimentelle Untersuchung über
den Einfluß des Nervensystems bei der Ent-
stehung des runden Magengeschwürs
Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena
30; 189-229 (1918)

- Haeller, S.J. Untersuchungen zur neurogenen Pathogenese
des Ulcus ventriculi pepticum
Münch. med. Wschr. 67: 393-397 (1920)
- Kroenlein Über Ulcus und Stenosis des Magens
nach Trauma
Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena 4:
493-504 (1899)
- Lebert, H. Beiträge zur Geschichte und Ätiologie des
Magengeschwürs
Berliner klin. Wschr. 13: 557-560 (1876)
- Leger, L.
Detric, Ph. Ulcerations aiguës hémorrhagiques de l'esto-
mac; le problème de l'exulceratio simplex
Arnavielhe, J. Presse méd., Paris 65: 1188-1191 (1957)
u. Guyet, P.
- Leube, W. Ulcus ventriculi traumaticum
Zbl. klin. Med. 7: 81-83 (1886)
- Lichtenbelt, Th. Die Ursache des chronischen Magengeschwürs
Gustav Fischer Jena (1912)
- Lieblein, V. Über Magen- und Darmblutungen nach Milz-
extirpation
Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena
17: 431-446 (1907)
- Macfarlane, J.
zitiert aus: G. Hauser: Die peptischen Schädigungen des
Magens, des Duodenums und der Speiseröhre
und das peptische postoperative Jejunal-
geschwür
im "Handbuch der speziellen pathologischen
Anatomie und Histologie"
F. Henke und O. Lubarsch 4 l. Teil S. 560
Julius Springer (1926)
- Mallory, G.K. Hemorrhages from lacerations of the cardiac
u. Weiss, S. orifice of the stomach due to vomiting
Amer. J. Med. Sc. 178: 506-514 (1929)

- Marchetti, G. Pathogenesi dell' ulcera gastrica e sue applicazioni terapeutiche
Riforma med., Napoli 50; 1373-1378 (1906)
- Masten, M.G. Neurogenic Erosions and Perforations of the
Stomach and Esophagus in cerebral Lesions
u. Bunts, R.C. Arch. Int. Med., Chicago 54; 916 -930(1934)
- Merkel, H. Über experimentelle Erzeugung akuter und
chronischer peptischer Magenschleimhaut-
veränderungen durch Histamin
Beitr. path. Anat., Jena 106; 223-261(1942)
- Millard, M. Fatal rupture of gastric aneurysma, case
report with review of the literature
Arch. Path., Chicago 59; 363-371 (1955)
- Ophüls, W. Gastric ulcera in rabbits following resection
of the pneumogastric nerves below the dia-
phragma
J. Exper. Med. 8; 181-192 (1906)
- Overzier, Cl. Zur Methodik und Entstehung der experimentell
erzeugten Ulcera ventriculi bei der Ratte
Zschr. exper. Med. 126; 23-32 (1955)
- Pincus, J. Experimenta de vi nervi vagi et sympathici
Inaug. Diss. Breslau (1856)
- Rindfleisch, E. Lehrbuch der pathologischen Gewebelehre
Wilhelm Engelmann Leipzig 311-312 (1878)
- Ritter, A. Über den Einfluß von Traumen auf die Ent-
stehung des Magengeschwürs
Zschr. klin. Med. 12; 592-596 (1887)
- Rössle, R. Das runde Geschwür des Magens und des
Zwölffingerdarms als "zweite Krankheit"
Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena
25; 766-796 (1913)
- Rokitansky, C. A Manual of pathological Anatomy
London, The Sydenham Society 2; 36 (1849)
- Rosenbach, Fr. Experimenteller Beitrag zur Pathogenese des
u. Eschker Ulcus rotundum
Arch. klin. Chir., Berlin 94; 481-195 (1911)

- Saitta Contributo alla pathogenese dell' ulcera gastrica
Gazz. osp., Milano 21; 599-604 (1900)
- Scheidegger, S. Über zwei seltene Formen von Blutungen aus Speiseröhre und Magen
Frankf. Zschr. Path. 44; 527-539 (1933)
- Schiff, M.
zitiert aus: G. Hauser: Die peptischen Schädigungen des Magens, des Duodenums und der Speiseröhre und das peptische postoperative Jejunalgeschwür
im "Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie"
F. Henke und O. Lubarsch 4 l. Teil S. 578
Julius Springer (1926)
- Schlumberger, H.G. Coexistent gastroduodenal and cerebral lesions in infancy and childhood
Arch. Path., Chicago 52; 43-46 (1951)
- Selye, H. Einführung in die Lehre vom Adaptations-syndrom
Georg Thieme Verlag Stuttgart (1953)
- Staemmler, M. Gehirnkrankung und Magengeschwür
Dtsch. med. Wschr. 74; 1485-1488 (1949)
- Strassmann, G.S. Relation of acute mucosal hemorrhagies and ulcers of gastrointestinal tract to intracranial lesions
Arch. Neurol. Psychiatr., London
57; 145-160 (1947)
- Streicher, G.J.
u. Schlosser, V. Seltene Ursachen schwerer Gastrointestinalblutungen
Münch. med. Wschr. 106; 1237-1242 (1964)
- Talma, S. Untersuchungen über Ulcus ventriculi simplex, Gastromalacie und Ileus
Zschr. klin. Med. 17; 10-61 (1890)
- Thiem, C. Ein durch Unfall herbeigeführtes Magengeschwür
Mtschr. Unfallhk., Leipzig 5; 154-155 (1899)

- Tönnis, W.
u. Bischof, W. Störungen innerer Organe bei Erkrankungen
des Gehirns und des Rückenmarks
J.A. Barth Leipzig (1961)
- Vanni, L. Sull' ulcera dello stomaco d'origine
traumatica
Sperimentale Firenze 64: 113-132 (1889)
- Vassale, G.
u. Sacchi, E. Sulla tossicità dei tessuti scottati
Riforma med., Napoli 4: 544-548 (1893)
- Veil, W.
u. Sturm, A. Die Pathologie des Stammhirns und ihre
vegetativen klinischen Bilder
Gustav Fischer Jena (1946)
- Virchow, R. Historisches, Kritisches und Positives
zur Lehre der Unterleibsaffektionen
Virchows Arch. path. Anat. 5: 363 (1853)
- Vogel, Th.
Hempel, K.-J. Über die Kombination flächenhafter
Blutungen
u. Lange, H.J. Frankf. Zschr. Path. 74: 420-424 (1965)
- Statistische Untersuchungen über die
Häufigkeit flächenhafter Blutungen bei
cerebralen Erkrankungen
Beitr. path. Anat. Jena 129: 394-413 (1963/64)
- Wachsmuth, W. Zur Frage der postoperativen Magenblutungen
Der Chirurg 14: 596-599 (1942)
- Zur Frage der profusen neurovasculär be-
dingten Schleimhautblutungen
Arch. klin. Chir., Berlin 274: 490-509 (1958)
- Wassner, J. Erfahrungen in der Behandlung der akuten
schweren Magenblutung
Zbl. Chir. 88: 1303-1307 (1963)
- Westphal, K. Untersuchungen zur Frage der nervösen
Entstehung peptischer Ulzera
Dtsch. Arch. klin. Med. 114: 327-395 (1914)

J. Lebenslauf.

== =====

Am 13.6.1938 wurde ich als Tochter des Dr.-Ing. Walter Heimann und seiner Ehefrau Lieselotte, geb. Brennecke, in Berlin geboren.

Durch die Kriegsereignisse mußte ich 1943 mit meiner Familie Berlin verlassen, und wir zogen zuerst nach Seewitz /Warthegau, wo ich 1944 eingeschult wurde. 1945 zogen wir dann nach Dauborn /Limburg. Dort verbrachte ich die restlichen Volksschuljahre. 1948 trat ich in die Sexta der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden ein, in dieser Schule machte ich 1958 mein Abitur.

Danach begann ich in Berlin ein Studium an der Kunstakademie. Nach 1 Jahr wechselte ich für 1/2 Jahr nach Karlsruhe an die Kunstakademie über. Dort mußte ich auf Grund einer schweren Erkrankung mein Studium aufgeben und verbrachte die folgenden 1 1/2 Jahre zur Erholung in den Bergen.

1961 begann ich das Medizin-Studium an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Nach 1 Jahr bestand ich das Vorphysikum, nach weiteren 1 1/2 Jahren das Physikum.

Ich habe das 5. klinische Semester beendet und werde mich zum 6. Semester in Mainz zum Staatsexamen melden.

Am Schluß meiner Arbeit sei Herrn Professor Dr. med. H.G. Fassbender für das gestellte Thema und die vielen wertvollen Ratschläge herzlich gedankt.

Herrn Professor Koller und seinen Mitarbeitern sei an dieser Stelle besonders für die entgegenkommende Beratung bei den statistischen Problemen dieser Arbeit gedankt.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and interesting in the history of science.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the various theories of the origin of life. It is shown that the most plausible theory is the theory of spontaneous generation.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the various experiments which have been conducted in order to test the theory of spontaneous generation. It is shown that the results of these experiments are in favor of the theory.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the various objections which have been raised against the theory of spontaneous generation. It is shown that these objections are not valid.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the various conclusions which can be drawn from the foregoing. It is shown that the theory of spontaneous generation is the most plausible theory of the origin of life.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the various applications of the theory of spontaneous generation. It is shown that the theory has many important applications in the history of science.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the various conclusions which can be drawn from the foregoing. It is shown that the theory of spontaneous generation is the most plausible theory of the origin of life.

